



**Данное издание оцифровано  
в Воронежской областной  
универсальной научной библиотеке  
им. И.С. Никитина**

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 2 / ул. Орджоникидзе, 36

Понедельник—четверг 9.00-20.00  
Суббота, воскресенье 12.00-20.00  
Пятница -выходной

<http://vrnlib.ru>  
<http://vk.com/vounb>  
e-mail: [vounb@mail.ru](mailto:vounb@mail.ru)  
+7 (473) 255-05-91

К 58  
МЧВ

~~А 4166.~~

ФЛОРЫ  
ЗАДОИНСКОГО  
ЧЕЗЛА

~~1986.~~

~~1983~~ op. 6.  
~~om 8/11~~

Возвратите книгу не позже:  
25.09.04.

26 M

Московского Учителльского Института

~~N 4166~~ 4166

42  
2088

K 58  
МЧВ



# ФЛОРА

ЗАДОНСКАГО УЕЗДА

ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(Съ картой).

П. Мельгунова.

ПРОВЕРЕНО

ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛ. БИБЛИОТЕКА


6016

434845

К8

Издание Императорского Московского Общества Испытателей Природы.

МСЧ 187



Университетская типография, Страстной бульв.

ОГД. ГУБАНОВА

# ФЛОРА ЗАДОНСКАГО У҃ЗДА ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ.

I

Такъ какъ Задонскій уѣздъ Воронежской губ. никогда не былъ предметомъ сколько-нибудь систематического ботаническаго изслѣдованія, то предлагаемый списокъ, встрѣчающихся въ немъ дико, растеній, быть можетъ, не лишень иѣкотораго научнаго интереса. Материалъ, послужившій для его составленія, собранъ мною болѣею частью лично, во время лѣтніхъ вакацій съ 1871-го по 1882-й, приблизительно, годъ; раза два за это время мнѣ удалось познакомиться и съ весеннюю флорою и собрать довольно значительное число видовъ, иѣкоторые же недостающіе были собраны и засушены по моему порученію. Центромъ моихъ изслѣдованій было сельцо *Нечаевка*, но, сверхъ того, я иѣсколько разъ предпринималъ специальный экскурсіи по уѣзду, преимущественно по берегамъ Дона и Воронежа, которые доставили мнѣ много новыхъ и интересныхъ данныхъ \*). Кромѣ лично собраннаго мною материала, я могъ воспользоваться также весьма небольшимъ, но очень интереснымъ, гербарiemъ г. Исаева (одного изъ служащихъ на сахарномъ Боринскомъ заводѣ): все въ немъ найденное я (съ указаніемъ) внесъ въ свой списокъ. Сверхъ того В. Я. Цингеръ любезно предоставилъ мнѣ, присланный ему г. Гинальскимъ, списокъ растеній, собранныхъ около с. Патріаршаго (всего 270 видовъ). Данными г. Гинальского я могъ воспользоваться въ меньшемъ объемѣ, потому что иѣкоторыя изъ нихъ возбуждали сомнѣніе въ точности опредѣленія и, кромѣ того, вслѣдствіе полнаго отсутствія какихъ бы

<sup>\*)</sup> Мѣстности, болѣе или менѣе изученныя мною, обозначены на прилагаемой картѣ. Прибавлю, что *Быкъ* и *Моховатый верхъ*, часто упоминаемые въ спискѣ, на картѣ не могли быть обозначены; оба лежатъ недалеко отъ Нечасевки, по течению рѣчки Черниевки или Рогожинки. „*Быкъ*“ представляетъ собой высыпанный известковый утесъ; формою его и объясняется самое народное название.

то ни было указаній, не всегда являлась возможность решить, какое растение внесено въ перечень, дико ли растущее или искусственно разводимое (напр. *Hissopus* и др.). Въ списокъ свой я внесъ также нѣсколько видовъ, найденныхъ мною въ Паниковцѣ Елецкаго у. Орловской г. (ихъ, впрочемъ, очень немного), такъ какъ Паниковецъ лежитъ погранично съ немногими (и мало мнѣ известными) участками Задонского уѣзда по ту сторону (т. е. правую) Дона.

II.

Списокъ растеній Задонской флоры.

I) DYCOTYLEDONEAE.

Ranunculaceae.

1. *Clematis recta* L. По кустарникамъ и лѣсамъ въ верхахъ. Довольно часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ) \*)
2. *Thalictrum aquilegifolium* L. По лѣсамъ и кустарникамъ. Часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
3. *T. Jacquinianum* Koch. Поросшіе кустарн. и открытые склоны. Нерѣдко.
4. *T. minus* L. По открыт. и поросшимъ кустарникамъ склонамъ. Оч. часто. ( $\frac{1}{2}$ ).
- 5) *T. angustifolium* Jacq. По сырьимъ мѣстамъ въ лѣсахъ, оврагахъ, около прудовъ. Не часто и разсѣянно. (Скитскій лѣсъ, Ямки, Паниковецъ Елецк. у.).  $\alpha)$  *stenophyllum* Koch.  $\beta)$  *heterophyllum* Koch.  $\gamma)$  *laserpitiiifolium* Koch. (рѣже предыдущихъ разновидностей; горный мокрый лѣсъ бл. Паникова).
6. *T. flavum* L.  $\beta)$  *rufinerve* Rgl. Рѣдко. Поемные луга по р. Воронежу бл. Подгорного и Бѣлоколодзскаго ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{3}$ ); заливной лугъ Дона бл. Казачьяго ( $\frac{1}{2}$ ).
7. *T. simplex* L. По кустарникамъ и лѣсамъ ( $\frac{1}{2}$ ); *v. intermedium* Rgl. Сырые лѣсные обрывы бл. Бѣлоколодзскаго.
8. *Anemone ranunculoides* L. По лѣсамъ и садамъ, часто ( $\frac{2}{3}$ ).

\*) *Clematis integrifolia* L. показана въ спискѣ г. Гинальскаго. Миѣ лично въ Задонск. у. это раст. не встрѣчалось, но по ту сторону Дона въ Елецк. у. Орловской г. (Лаповка, Галачья гора) я находилъ его въ большомъ числѣ.

9. *A. sylvestris* L. Сухія и возвишенныя, открытыя и лѣсныя мѣста ( $\frac{++}{--}$ ).

10. *Pulsatilla patens* Mill. Открытыя и лѣсныя возвишенныя мѣста (Нечаевка, Моксоватый верхъ, Викулинскій лѣсъ и т. д.) ( $\frac{-}{+}$  и  $\frac{++}{--}$ ).—14-го августа 1877 г. найдено два вторично цвѣтущ. экземпляра.

11. *Adonis vernalis* L. Открытыя возвишенности, южные склоны, по межамъ, садамъ и т. д. Часто ( $\frac{+}{-}$  и  $\frac{++}{--}$ ). На перегнойной почвѣ, особенно крупные экземпляры (22-го апр. 1875 г., 9 апр. 1876 г.—нач. цвѣтенія).

12. *Myosurus minimus* L. Въ болѣе близко мнѣ известной части уѣзда, несмотря на тщательные поиски, мнѣ попался только одинъ, и, притомъ, случайный (на дерновой кочкѣ въ Скитскомъ лѣсу), экземпляръ, но, по словамъ г. Исаева, бл. самаго Задонска ему приходилось находить *Myosurus* въ болѣе значительномъ количествѣ (на песчаной почвѣ?).

13. *Ceratocephalus orthoceras* Desv. Известковые обрывы бл. Кизизова ( $\frac{++}{--}$ ).

14. *Batrachium divaricatum* Schr. Рѣка Воронежъ и заливные прудки вдоль ея ( $\frac{++}{--}$ ). По Дону рѣдокъ (заливное озерко близъ Казачьяго); v. *terrestre* m. — форма наземная, ползучая, съ нѣсколько мясистыми, черешковыми листьями, укороченными и укореняющимися стеблями и маленькими цветами. Высохш. иль заливи. водъ бл. Падовъ на Воронежъ, изрѣдка.

15. *R. Lingua* L. Стоячія воды по течению Воронежа (бл. Грязнаго); болото бл. Казачьяго ( $\frac{+}{-}$ ). Вообще, довольно рѣдко.

16. *R. Flammula* L. Заливные луга и болота по Воронежу (Подгорное, Грязное) ( $\frac{++}{--}$ ). Типическая, свойственная сѣверу, форма не найдена; у насъ встрѣч. только форма съ узкими листьями, короткими, укореняющимися побѣгами и маленькими цветами. ( $\beta$ ) *repans* L. (ср. Роговичъ, Обозр. раст. Кіевск. окр., стр. 8).

17. *R. auricomus* L.  $\alpha$ ) *typicus* Rupr.  $\beta$ ) *incisifolius* R. Обыкновенно ( $\frac{++}{--}$ ).

18. *R. cassubicus* L. По тѣнистымъ лѣсамъ на перегнойной почвѣ. Мѣстами.

19. *R. acer* L. Обыкновенно.

20. *R. polyanthemos* L. Обыкнов.

21. *R. repens* L. Часто.

22. *R. sceleratus* L. Сырыя песчаныя мѣста по Дону и т. д. ( $\frac{+}{-}$  и  $\frac{+}{\cdot}$ ).

23. *R. Illyricus* L. Найденъ г. Исаевымъ на песчаныхъ обрывахъ за Казачьимъ (и въ Елецк. у. бл. с. Панарына).

24. *R. pedatus* Kit. Открытая луговина Нечаевскаго парка ( $\frac{+}{\cdot}$ ). Цвѣтеть съ начала мая.

25. *Ficaria ranunculoides* Roth. Сырые лѣса и овраги ( $\frac{+}{\cdot}$ ).

26. *Caltha palustris* L. Мѣстами, въ весеннихъ лужахъ и т. д. (Патриаршее, Казачье, бл. Задонска и т. д.). Бл. Казачьяго найдено во вторичномъ цвѣту 17-го августа 1879 г. (Ср. Роговича о. с. стр. 10).

27. *Trollius Europaeus* L. ( $\frac{+}{\cdot}$ ).

28. *Delphinium consolida* L. Очень часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).

29. *D. elatum* L.  $\gamma$ ) *cuneatum* Stev. in DC. Яблоновъ верхъ бл. Нечаевки и др. м. ( $\frac{+}{\cdot}$ ). Встрѣчается въ двухъ формахъ: а) только верхніе листья клиновидные, все растеніе покрыто волосками и б) всѣ листья клиновидные, растеніе голое.

30. *Aconitum pallidum* Rchbch. (A. lycocotonum L.  $\beta$ , в Lebed.). Очень рѣдко. Найденъ одинъ экземпляръ въ тѣнистомъ горномъ лѣсу бл. Ситной (9-го июля въ цвѣту).

31. *A. Anthora* L.  $\alpha$ ) *angustifolium*. Рѣдко. Сухой возвышенный Викулинскій лѣсъ близъ Скита ( $\frac{+}{\cdot}$ ); 13-го августа въ самомъ началѣ цвѣтенія.

32. *Actaea spicata* L.  $\alpha$ ) *melanocarpa* Lebed. По тѣнистымъ горнымъ лѣсамъ, рѣдко и разсѣянно ( $\frac{+}{\cdot}$ ). (Оврагъ Викулинскаго лѣса, бл. Ситновой, бл. Бѣлоколодзскаго).

### Nymphaeaceae.

33. *Nymphaea alba* L. Преимущественно по Воронежу, въ самой рѣкѣ и въ заливныхъ озерахъ ( $\frac{++}{\cdot}$ ). По Дону рѣдко (заливное озеро близъ Казачьяго).

34. *Nuphar luteum* Sm. Idem.

### Papaveraceae.

35. *Chelidonium majus* L. На мусорной почвѣ, обыкновенно ( $\frac{++}{\cdot}$ ).

Fumariaceae.

- 36 *Corydalis solida* Sm. Часто (‡‡).
37. *Corydalis Marschalliana* Pers. Тънистые лѣса съ перегнойною почвою (Викулинск. лѣсь и др.) (‡‡).
38. *Fumaria officinalis* L. Паровыя поля (÷), а также и песчан. и каменистые обрывы (—).
- 39 *Fumaria Vaillantii* Lois. Известков. высоты Моховатаго верха, изрѣдка.

Cruciferae.

- 39 б. *Nasturtium amphibium* R. Br. α) *indivisum* DC (и *auriculatum* Rchbch. Icon. II, LII, 4363). β) *varrifolium* DC. Заливное озерко бл. Задонска (‡‡).
40. *N. Austriacum* Crantz. Сырые луга, паровыя поля, межи etc. Часто (‡‡); *v. pubescens* m. Все растеніе покрыто пушкомъ и имѣть болѣе сжатый видъ. Рѣже типической формы.
41. *N. sylvestre* R. Br. (‡‡). α) *pinnatipartitum*. β) *sub-indivisum* Kaufm.
42. *N. anceps* DC. (‡‡).
43. *N. palustre* DC. (‡‡).
44. *N. brachycarpum* C. A. M. Ручьи и воды, преимущественно по р. Воронежу (‡‡).
45. *N. armoracioides* Tausch. (‡‡).
46. *Barbara vulgaris* R. Br. α) *typica* (÷ и ‡‡).
47. *B. stricta* Andrz. Рѣдко; по сырьимъ мѣстамъ (Сергіевка, Подгорное) (—).
- 48 *Turritis glabra* L. Часто (— и ÷).
49. *Arabis pendula* L. Рѣдко. Тънистые и сырые склоны близъ Бѣлоколодзскаго (÷); тънистый обрывъ Дона бл. Паниковца (÷). 8-го июля въ цвету и съ первыми плодами.
- 49 б. *Arabis hirsuta* Scop. Тамъ же, изрѣдка.
50. *Cardamine pratensis* L. Кажется, встрѣчается только по заливнымъ лугамъ Воронежа.
51. *C. impatiens* L. Рѣдко (Сыре мѣсто около ручья въ Викулинскомъ лѣсу ÷).
52. *C. amara* L. По тънистымъ лѣсамъ и сырьимъ мѣстамъ, не часто.

53. *Dentaria bulbifera* L. Гористое место Муравлянского леса  $\frac{++}{\cdot}$ ; 6-го мая почти совершенно отцвѣла.
54. *Hesperis matronalis* L.  $\alpha$ ) *integrifolia* Mal (H. inodora L.). Садъ, дворъ и окрестности Нечаевской усадьбы. Дико ли? (Указывается также г. Гинальскимъ въ его спискѣ).
55. *Syimbrium officinale* Scop.  $\frac{++}{\cdot}$ .
56. *S. Loeselii* L.  $\frac{++}{\cdot}$ . Мѣстами, особенно по песчаному возвышенному берегу Дона, составляетъ цѣлые чащи и достигаетъ громадной высоты.
57. *S. Sophia* L.  $\frac{\cdot}{+}$  и  $\frac{++}{\cdot}$ .
58. *S. pannonicum* Jacq. По межамъ и дорогамъ встрѣчается только разсѣянно ( $\frac{-}{-}$ ), по каменистымъ же известковымъ возвышенностямъ (Моховатое, Быкъ и др.) въ большомъ количествѣ ( $\frac{\cdot}{+}$  и почти  $\frac{++}{\cdot}$ ).
59. *S. junceum* M. а *B.* Рѣдко и разсѣянно. (Берегъ Дона бл. Кошаръ и въ друг. мѣст.  $\frac{-}{-}$ ).
60. *S. strictissimum* L. Мокрый обрывъ бл. Бѣлоколодзскаго ( $\frac{-}{-}$ ).
61. *S. Thalianum* G. et M. Паровые поля.  $\frac{++}{\cdot}$ .
62. *Erysimum cheiranthoides* L.  $\frac{\cdot}{+}$ .
63. *E. Marschallianum* Andrz. По садамъ etc.  $\frac{\cdot}{+}$ .
64. *E. hieracifolium* L. (E. strictum. Fl. Wet.). Часто. По открытымъ и тѣнистымъ мѣстамъ ( $\frac{\cdot}{+}$ ).
65. *Brassica campestris* L. Паровые поля, сады etc.  $\frac{\cdot}{+}$ .
66. *Synapis arvensis* L  $\alpha$ ) *typica*. Часто.  $\beta$ ) *Schkuhriana* Rchbch. (*S. orientalis* Murr.). Рѣже предыдущей.
67. *Syrenia angustifolia* Rchbch. Известковый обрывъ Моховатаго верха и Быка  $\frac{\cdot}{+}$ . 12-го июня въ полн. цв.
68. *Alyssum montanum* L. По каменнымъ высотамъ. (Близъ Хлѣвнаго; каменоломни бл. Ельца)  $\frac{++}{\cdot}$ .
69. *A. minitum* Willd. По каменистымъ обрывамъ (Хлѣвное, Быкъ; между Каменкой и Паниковцемъ)  $\frac{++}{\cdot}$ . Въ началѣ мая 1880 съ цвѣт. и перв. плодами, 10-го июня съ плодами и послѣдн. цвѣт.; вторичное цвѣтеніе съ конца июня.
70. *Psiloneta calicinum* C. A. M. Известков. высоты бл. Хлѣвнаго ( $\frac{\cdot}{+}$ ).
71. *Berteroa incana* DC. Часто  $\frac{++}{\cdot}$ .
72. *Draba verna* L. Открытая мѣста, паровые поля. Часто.  $\frac{++}{\cdot}$

73. *D. nemorosa* L.  $\alpha)$  *leiocarpa* Lindbl (D. lutea DC.). Поля, луга etc. Часто  $\frac{++}{++}$ .
74. *D. repens* M. a B. Открытые возвышенные места  $\frac{++}{++}$ .
75. *Cochlearia Armoracia* L. По берегу Дона  $\frac{-}{-}$ . Дико?
76. *Camelina sativa* Cr. Между посевами редко и раздельно (Нечаевка  $\frac{-}{-}$ ).
77. *C. microcarpa* Andrz. Открытые каменные обрывы ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ) (Моховатый верхъ и др. места).
78. *Thlaspi arvense* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
79. *Lepidium ruderale* L. Часто  $\frac{++}{++}$ .
80. *L. latifolium* L. Берегъ Дона бл. Бестужева  $\frac{+}{+}$ .
81. *Capsella Bursa pastoris* Moench. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
82. *Neslia paniculata* Desv. Между посевами  $\frac{-}{-}$  и  $\frac{+}{+}$ .
83. *Bunias orientalis* L. Часто  $\frac{+}{+}$ .
84. *Isatis tinctoria* L. Песчаные и каменистые обрывы Моховатаго верха  $\frac{+}{+}$ . Цвѣтеть въ маѣ, плоды въ юнѣ и юль; вторичные боковые побѣги цвѣтутъ иногда въ половинѣ юля.
85. *Raphanus Raphanistrum* L. Между посевами, довольно редко, только на песчаныхъ мѣстахъ ( $\frac{-}{-}$ ).

Cistineae.

86. *Helianthemum vulgare* Gaertn.  $\alpha)$  *tomentosum* Koch. По лѣснымъ и кустарникамъ, склонамъ, особенно на песчаной почвѣ  $\frac{+}{+}$  (бл. Казачьяго, Муравлянскій лѣсъ, Нечаевка; опушка сосновой рощи бл. Паниковца).

Violarieae.

87. *Viola palustris* L. Въ юлѣ найдены листья (какъ показалось, именно этого вида, а не *V. epipsila* Ldb.) по болотамъ на берегахъ Воронежа. По словамъ г. Исаева, онъ находилъ *V. palustris* въ Землянскомъ уѣздѣ.
88. *V. hirta* L. Часто  $\frac{+}{+}$ .
89. *V. mirabilis* L. Часто  $\frac{+}{+}$ .
90. *V. collina* Besser. Глинистые обрывы бл. Нечаевки.
91. *V. canina* L.  $\alpha)$  *typica* Trautv. Часто.  $\beta)$  *montana* L. Муравлянскій лѣсъ.
92. *V. arenaria* DC. По лугамъ, часто,  $\frac{++}{++}$ .

93. *V. sylvestris* Lam. β) *Riviniana* Koch. (*V. Riviniana* Rehbch.). Возвышенные лесные и кустарные места  $\div \div$  (Викулинский, Скитский, Муравлянский лесъ).

94. *V. tricolor* L. α) *vulgaris* Koch. β) *arvensis* Murr. Часто.

Droseraceae.

95. *Parnassia palustris* L. Найдена мною въ одномъ только местье, въ единственномъ, извѣстномъ мнѣ, меистомъ болотѣ уѣзда, въ Муравлянскомъ лѣсу. 20-го июня съ еще нераспустившимися цветами. (Показана г. Гинальскимъ въ его списѣ).

Polygaleae.

96. *Polygala sibirica* L. Известковые склоны Быка и Моховатаго верха  $\div$ . 10-го июня начало цвѣтенія.

97. *P. comosa* Schk. Часто.

98. *P. vulgaris* L. Часто.

Sileneae.

99. *Gypsophila muralis* L. Часто  $(\div \div)$ .

100. *G. altissima* L. γ) *latifolia* Fenzl. Известковые обрывы Моховатаго верха и Быка  $(\div)$ .

101. *G. paniculata* L. Высокія открытые места, склоны, межи и т. д. Довольно часто  $(\div \text{ и } \div \div)$ .

102. *Dianthus capitatus* DC. М. В. По лугамъ и лѣсамъ не рѣдко  $(\div)$ .

103. *D. Carthusianorum* L. Найденъ въ Липецк. у. на самой границѣ съ Задонскимъ, на пескѣ.

104. *D. deltoides* L. По лѣсамъ и лугамъ  $(\div)$ .

105. *D. Seguieri* Villd. По лѣсамъ и лугамъ; не часто  $(\div)$ .

106. *D. campestris* M. a B. По солнечнымъ (преимущественно известковымъ) высотамъ и склонамъ  $\div \div$  (Моховатый верхъ, Нечаевка, Хлѣвное).

107. *D. superbus* L. По кустарникамъ и лѣсамъ, преимущественно холмистымъ. Не рѣдко  $(\div)$ .

108. *Vaccaria vulgaris* Host. Между посѣвами; особенно много среди *Linum usitatissimum* (бл. Муравлянского лѣса и въ др. м.  $(\div)$ ).

109. *Saponaria officinalis* L. Кромъ обычнаго мѣстонахождѣнія по берегамъ рѣкъ, встрѣчается и на песчаныхъ обрывахъ по известковымъ склонамъ (Моховатый верхъ; форма съ темными лепестками). Наше растеніе все покрыто волосками и тѣмъ отличается отъ германскихъ («calyce... glabro» Koch, Synop. pag. 86) и Московскихъ (только «чашечка покрыта рѣдкими волосками» Кауфм. Моск. фл. стр. 81) и какъ бы составляетъ переходъ къ *S. glutinosa* M. a B.

110. *Silene inflata* Sm. Оч. часто.

111. *S. Orites* Sm. Известковые склоны Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ) и др. м.

112. *S. effusa* Otth. (*S. Wolgensis* Spreng.). Тамъ же, но рѣже ( $\frac{1}{2}$ ).

113. *S. chlorantha* Ehr. Тамъ же ( $\frac{1}{2}$ ).

114. *S. repens* Patr. Песчаныя мѣста по заливному берегу Дона  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . По Воронежу (Подгорное  $\frac{1}{2}$ ).

115. *Silene Sibirica* Pers. По берегу Дона бл. Бестужева ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ); въ друг. мѣстахъ изрѣдка (Кошары  $\frac{1}{2}$ ).

116. *S. Tatarica* Pers. По берегу Воронежа бл. Ситной и въ друг. мѣстахъ ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

117. *S. nutans* L. Часто.

118. *S. noctiflora* L. По садамъ, сорнымъ мѣстамъ и на пасчныхъ поляхъ (низкорослые экземпляры) часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

119. *Silene viscosa* Pers. Луговина Нечаевскаго парка, открытые склоны Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ); вообще, не часто.

120. *Cucubalus baccifer* L. Сырыя горныя мѣста бл. Ситной ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ); бл. Паникова Елец. у.

121. *Lychnis pratensis* Spr. Оч. часто ( $\frac{1}{2}$ ). Variat flore dilute roseo (сыре мѣсто у ручья бл. Нечаевки).

122. *L. flos cuculi* L. Оч. часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

123. *L. viscaria* L. Оч. часто ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

124. *L. Chalcedonica* L. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ, мѣстами (Скитскій лѣсъ, бл. Паникова и т. д.  $\frac{1}{2}$ ).

125. *Agrostemma Githago* L. Часто ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

#### Al sineae.

126. *Sagina procumbens* L. Часто ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

127. *Spergula arvensis* L. Въ посѣвахъ ( $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ).

128. *Spergularia rubra* Pers. (♦♦).
129. *Arenaria serpyllifolia* L. Преимущественно на песчаной почвѣ (♦♦).
130. *A. graminifolia* Schrad. β) *grandiflora* Fenzl. По сухимъ склонамъ и т. д.; нерѣдко (÷).
- γ) *pubescens* Ledeb. (*A. filifolia* M. B.). Кроме желѣзистыхъ волосковъ, отличается щетинистыми и пучковатыми листьями, меньшимъ ростомъ и обычнов. меньшимъ количествомъ цвѣтовъ. Известковый обрывъ Быкъ (♦♦).
131. *Moehringia trinervia* Clairv. Сырыя мѣста бл. ручья въ Нечаевкѣ (♦♦) и въ др. м.
132. *M. lateriflora* Fenzl. Лѣсн. песчан. обрывъ бл. Бѣлого колодаскаго, рѣдко (÷).
133. *Stellaria Holostea* L. По тѣнистымъ лѣсамъ (♦♦).
134. *S. graminea* L. Часто (♦♦).
135. *S. glauca* L. Сырой лугъ бл. Казачьяго (♦♦).
136. *S. media* Vill. Часто (♦♦).
137. *Malachium aquaticum* Fr. По сырьимъ берегамъ ручьевъ (♦♦).
138. *Cerastium triviale* Link. Часто (♦♦).
139. *C. arvense* L. По открыт. возвышеннымъ мѣстамъ, часто (÷ и ♦♦).

#### Lineae.

140. *Linum flavum* L. β) *lanceolatum* Lind. Каменистые обрывы Моховатаго верха (÷ и ♦♦) и въ друг. мѣстахъ, изрѣдка.
141. *L. perenne* L. Камен. обрывъ Моховатаго верха и на Быкѣ (÷); каменистый берегъ Дона между Задонск. и Казачьимъ (♦♦).
142. *L. catharticum* L. Возвышенная лѣсная мѣста ♦♦ (Скитский лѣсъ, Казачье и др.).

#### Malvaceae.

143. *Malva neglecta* Wallr. Часто (♦♦).
144. *M. borealis* Wallm. Idem.
145. *Lavatera Thuringiaca* L. Возвышенные мѣста, преимущ. по берегамъ рѣкъ (какъ кажется, только на песчаной и глинистой почвѣ) ÷ и ♦♦.

146. *Althaea officinalis* L. Сырой оврагъ между Слѣповкою и Куликовкою (—); 8-го Июля въ полн. цв.

Tiliaceae.

147. *Tilia parvifolia* Ehrh. Часто; сплошныхъ лѣсовъ не образуетъ, но иногда встрѣчаются сплошные кустарники.

Hypericineae.

148. *Hypericum perforatum* L. Часто (—).

149. *H. quadrangulum* L. Id.

150. *H. hirsutum* L. По тѣнистымъ лѣсамъ (Нечаевка, Сергіевка) (—).

151. *H. elegans* Steph. Встрѣчаются двѣ формы: а) высокая, по кустарникамъ, оврагамъ и лугамъ—Нечаевка (—), и б) низкая, по открытымъ каменистымъ склонамъ (Быкъ) (—).

Acerineae.

152. *Acer platanoides* L. По лѣсамъ и садамъ, обыкновенно отдѣльными экземплярами (— и —).

153. *A. campestre* L. Нерѣдко.  $\beta$  *leiocarpum* Moly (— и —).

154. *A. tataricum* L. Нерѣдко (— и —).

Geraniaceae.

155. *Geranium pratense* L. Часто.

156. *G. palustre* L. По сырьимъ мѣстамъ; часто.

157. *G. sylvaticum* L. По лѣсамъ.

158. *G. sanguineum* L. По кустарникамъ и лѣсамъ, мѣстами (—).

159. *Geranium sibiricum* L. Сырые обрывы бл. Бѣлоколодзскаго (—) (Троицкое Липецк. у., песчаный обрывъ между Каменкою и Паниковцемъ Елецк. у.).

160. *G. pusillum* L. Гористый берегъ Воронежа бл. Ситновой (—); обрывъ между Каменкою и Паниковцемъ (—); въ самомъ г. Задонскѣ, въ саду (г. Исаевъ).

161. *Erodium cicutarium* L. Сырыя песчаныя мѣста по берегу Дона, часто (—); по мусорнымъ мѣстамъ около жилищъ, изрѣдка (—).

Balsamineae.

162. *Impatiens noli tangere* L. По ручьямъ и т. д., часто (‡‡).

Celastrineae.

163. *Erythronium verrucosum* Scop. Часто (‡ и ‡‡).

164. *E. europaeus* L. Рѣже предыдущаго (‡). (Яблоновъ верхъ бл. Нечаевки, Муравлянскій лѣсъ, Ситная и др.).

Rhamneae.

165. *Rhamnus frangula* L. Часто (‡‡).

166. *R. cathartica* L. По возвышеннымъ кустарник. и лѣсамъ, нерѣдко (— и †).

Papilionaceae.

167. *Genista tinctoria* L. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ. Часто (‡).

168. *Cytisus Ratisbonensis* Schaeff. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ. Часто (‡).

169. *Otonis hircina* Jacq.  $\alpha$ ) *inermis* Ledeb. По каменистому и песчаному берегу Дона (Кошары, Хлѣвное) въ полосѣ разлива (‡‡).

170. *Anthyllis vulneraria* L. Возвышенный лугъ бл. Нечаевки; опушка лѣса бл. Паниковца. Обыкновенно островками (‡).

171. *Medicago sativa* L. Нечаевскій садъ (—), опушка лѣса бл. Паниковца (—). Дико ли?

172. *M. falcata* L. Часто (‡‡).

173. *M. lupulina* L. Часто (‡‡).

174. *Melilotus albus* Desr. Часто (‡‡), особенно по берегу Дона.

175. *M. officinalis* Desr. Часто (‡‡), особенно по берегу Дона.

176. *Trifolium lupinaster* L.  $\beta$ ) *purpurascens* Ledeb. Сѣверный, поросший кустарникомъ, склонъ Моховатаго верхъ †.

177. *T. pratense* L. Часто (‡‡); нерѣдко встрѣчается и разновидность съ желтоватыми цветами ( $\beta$ ) *intermedium* Lindm.).

178. *T. medium* L. Рѣже предыдущаго (‡ и ‡‡).

179. *T. alpestre* L. По лъсамъ, кустарникамъ и т. д. ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
180. *T. montanum* L. Часто ( $\frac{1}{2}$ ).
181. *T. arvense* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
182. *T. repens* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
183. *T. hybridum* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
184. *T. fragiferum* L. Заливные луга р. Воронежа бл. Подгорного ( $\frac{2}{3}$ ).
185. *T. spadiceum* L. Сырыя мѣста около ручьевъ  $\frac{2}{3}$  (Скитский лѣсъ). Не часто.
186. *T. agrarium* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
187. *Lotus corniculatus* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ); *v. gracilis* m. (низкорослая, приземистая, малоцвѣтн. (1—3 цвѣтка) форма. Каменистые высоты близъ Хлѣбнаго ( $\frac{2}{3}$ ).
188. *Oxytropis pilosa* DC. Рѣдко. Известковый склонъ Моховатаго верха —.
189. *A. Onobrychis* L.  $\alpha$ ) *vulgaris* Ledeb. Известковый склонъ Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ), высоты бл. Хлѣбнаго и др. м.; особенно часто по известковому заливному берегу Дона ( $\frac{2}{3}$ ).
190. *A. virgatus* Pall. Известковый склонъ Моховатаго верха ( $\frac{2}{3}$ ).
191. *A. Austriacus* Jacq. Известковый склонъ Моховатаго верха и Быка, известковыя высоты бл. Хлѣбнаго ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
192. *A. cicer* L. По кустарникамъ ( $\frac{1}{2}$ ).
193. *A. glycyphyllos* L. По кустарникамъ и лъсамъ, особенно гористымъ ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ) <sup>1)</sup>.
194. *Coronilla varia* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
195. *Ervum hirsutum* L. Пески по Дону и его притокамъ; изрѣдка ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}$ ).
196. *Vicia angustifolia* Roth.  $\alpha$ ) *segetalis* Koch. На наносномъ пескѣ Дона и его притокъ, довольно рѣдко ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}$ ).
197. *V. pisiformis* L. По гористымъ кустарникамъ (Нечаевка, Сергіевка, Муравлиное)  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ .
198. *V. cracca* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
199. *V. tenuifolia* Roth. По кустарникамъ; часто ( $\frac{1}{2}$ ).

<sup>1)</sup> Astr. *Hypoglottis* указывается въ спискѣ г. Гинзальскаго.

200. *V. sylvatica* L. По тѣнистымъ лѣсамъ  $\frac{++}{++}$  (Сергіевка, Скитскій л., Муравлиное).
201. *Lathyrus pratensis* L. Часто ( $\frac{+}{+}$ ).
202. *L. pisiformis* L. По гористымъ кустарникамъ; нерѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).
203. *L. palustris* L. Берега стоячихъ водъ бл. Казачьяго ( $\frac{+}{+}$ ).
204. *L. sylvestris* L.  $\alpha)$  *typicus*. Бл. Паниковца.  $\beta)$  *latifolius* Rupr. Лѣсъ бл. Рѣпца ( $\frac{+}{+}$ ).
205. *Orobus vernus* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
206. *O. albus* L. (*O. lacteus* M. B.). По кустарникамъ и лѣсамъ; не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).
207. *O. canescens* L. (*O. pallescens* M. B.). По кустарникамъ, изрѣдка.
208. *Onobrychis sativa* Lam. Сухія возвышенныя мѣста; не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).

Amygdaleae.

209. *Amygdalus nana* L. Открытыя возвышенности (Нечаевка, Моховатый верхъ и др. м.)  $\frac{++}{++}$ ; нерѣдко.
210. *Prunus spinosa* L. По кустарникамъ и лѣсамъ; нерѣдко ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
211. *P. Chamaecerasus* Jacq. По лѣсамъ и открытымъ склонамъ; часто ( $\frac{++}{++}$ ).
212. *Prunus padus* L. По лѣсамъ и садамъ ( $\frac{+}{+}$ ).

Rosaceae.

213. *Spiraea crenifolia* C. A. M. Известковый склонъ Моховатаго верха ( $\frac{++}{++}$ ).
214. *S. ulmaria* L.  $\alpha)$  *viridis* Mol.  $\beta)$  *discolor* Koch. Сырыя мѣста; часто ( $\frac{++}{++}$ ).
215. *S. Filipendula* L. Сухие луга; часто ( $\frac{++}{++}$ ).
216. *Geum urbanum* L. Часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
217. *G. strictum* Ait. Мѣстами ( $\frac{+}{+}$ ).
218. *G. rivale* L. По сырьимъ мѣстамъ ( $\frac{+}{+}$ ).
219. *Rubus idaeus* L. По лѣсамъ и верхамъ. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
220. *R. caesius* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
221. *R. saxatilis* L. По лѣсамъ; часто ( $\frac{++}{++}$ ).

222. *Fragaria vesca L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
223. *F. elatior Ehr.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
214. *F. collina Ehr.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
225. *Comarum palustre L.* По болотамъ, не часто; особ. по берегамъ Воронежа (Грязное и др. м.).  
226. *Potentilla anserina L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ); преимущественно по песчанымъ берегамъ рѣкъ.  
227. *P. Norvegica L.*  $\alpha)$  *typica*. Сыре песчаное мѣсто бл. устья р. Черняевки ( $\frac{-}{+}$ ).  
228. *P. Supina L.* Сырой песокъ бл. устья р. Черняевки ( $\frac{-}{+}$ ).  
229. *P. argentea L.*  $\beta)$  *incanescens Opiz.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
230. *P. Thuringiaca L.* и  $\beta)$  *Goldbachi Kaufm.* (P. Goldbachi Rupr.). Сухие кустарники ( $\frac{-}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
231. *P. recta L.*  $\alpha)$  *obscura Koch.* Опушка лѣса бл. Рѣпца, Скитскій лѣсъ ( $\frac{-}{+}$ ).  
232. *P. intermedia L.*  $\beta)$  *canescens Rupr.* Мѣстами ( $\frac{-}{+}$ ).  
233. *P. crataea L.* Сухія и открытыя мѣста ( $\frac{++}{++}$ ).  
234. *P. cinerea Chaix.* Сухие склоны ( $\frac{++}{++}$ ).  
235. *P. alba L.* Гористые кустарники и лѣса (Нечаевка, Мокшанский верхъ)  $\frac{-}{+}$ .  
236. *P. tormentilla Sibt.* Рѣдко; сырой кустарникъ бл. мшистаго болота Муравлянского лѣса; за р. Воронежомъ, въ хвойныхъ лѣсахъ Липецкаго уѣзда, въ огромномъ количествѣ; также въ соснов. лѣсу бл. Паниковца Елецкаго уѣзда.  
~~237.~~ *Rosa cinnamomea L.*  $\alpha)$  *vulgaris Meyer*  $\beta)$  *glabrifolia M.*  
238. *Agrimonia pilosa L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
239. *A. Eupatoria L.* Рѣже предыдущей ( $\frac{-}{+}$ ).  
240. *Alchemilla vulgaris L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
241. *Sanguisorba officinalis L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).

Ромасеae.

242. *Pyrus Malus L.* Лѣса, кустарники и поля (экземпляры, очевидно, уцѣлѣвшіе отъ вырубки лѣса). Часто, но разсѣянно ( $\frac{-}{+}$ ); близъ Ситной  $\frac{-}{+}$ .  
243. *P. communis L.* По лѣсамъ, но рѣдко ( $\frac{-}{+}$ ) (Калабинскій лѣсъ, Муравлянский лѣсъ).

БОРОДАЧКА  
АНТОНОВКА

244. *Sorbus Aucuparia* L. По лесамъ (—).

245. *Crataegus monogyna* Pall. Довольно часто (Муравлян-скій лѣсъ, Ситная, Паниковецъ), (— и —).  $\alpha)$  *typica* и  $\beta)$  *laciniata* Stev.

246. *Cotoneaster vulgaris* Lindl (fructu rubro). Каменистый обрывъ отвершка Моховатаго верха (—); 1-го июля 1880 съ спѣльми плодами.

Onagraceae.

247. *Epilobium angustifolium* L. Часто (—).

248. *E. hirsutum* L. Сырой горный лѣсъ бл. Ситной (—); бл. Паникова.

249. *E. montanum* L. Сырыя мѣста по лѣсамъ, кустарникамъ и оврагамъ (—).

250. *E. palustre* L. По сырьимъ мѣстамъ; часто (—).

251. *E. tetragonum* L. Сырой песчаный обрывъ бл. устья р. Черняевки (—).

252. *E. parviflorum* Schreb. Горный склонъ бл. Ситной (—) и др. м.

253. *Ocnothera biennis* L. По горнымъ, преимущ. каменнымъ и песчанымъ, склонамъ (—).

254. *Circaeа Lutetiana* L. Тѣнистые горные лѣса по течению Воронежа (—) (Ситная, Бѣлоколодское).

Haloragaceae.

255. *Myriophyllum spicatum* L. Въ рѣкѣ Воронежѣ (Грязнѣ, Бѣлоколодское) (—).

256. *M. verticillatum* L.  $\alpha)$  *pinnatifidum* W. Въ рѣкѣ Воронежѣ (—).

Hippurideae.

256. *Hippuris vulgaris* L.  $\alpha)$  *typicum*. Болота по р. Воронежу бл. Грязнаго (—).

Ceratophylleae.

257. *Ceratophyllum submersum* L. По р. Воронежу и въ стоячихъ водахъ около него (—).

258. *C. demersum* L. Ibid. (—).

Lythrarieae.

259. *Peplis Portula L.* Высохший иль по берегу заливного озерка бл. Кошаръ (??).

260. *Lythrum Salicaria L.* По сырьимъ мѣстамъ, часто (??).

261. *L. virgatum*. По берегу Дона довольно рѣдко (Казачье, ?), по берегу Воронежа часто (Подгорное, Грязное и др. м. ??).

Sclerantheae.

262. *Scleranthus annuus L.* Часто (??).

Paronychieae.

263. *Herniaria glabra L.* Часто (??).

264. *H. odorata Andrz.* На пескѣ бл. Хлѣвнаго (??).

Cucurbitaceae.

265. *Bryonia alba L.* По фруктовымъ садамъ не рѣдко (— и ?); берегъ горнаго ручья бл. Ксизова, гдѣ обвивается *Urtica dioica* (—).

Crassulaceae.

266. *Sedum maximum Sut.* Часто (?).

267. *S. purpurascens Koch.* Не рѣдко (?).

268. *S. acre L.* Часто (??).

Grossularieae.

269. *Ribes Grossularia L.* Изрѣдка встрѣчается по лѣсамъ (—; съ плодами не попадается). Дико ли? (Указывается и въ спискѣ г. Гинальскаго).

270. *R. nigrum L.* Въ Задонскомъ у. встрѣчается рѣдко (найдена г. Исаевымъ по р. Рѣпцу); на правой, Липецкой, сторонѣ Воронежа очень часто (??), но на лѣвой, кажется, не встрѣчается, или рѣдко (на всѣ разспросы мѣстные жители отвѣчали, что «на той сторонѣ» смородины много, а на «этой» не знаютъ).

Saxifrageae.

271. *Chrysosplenium alternifolium L.* По берегамъ ручьевъ въ сырьихъ лѣсахъ и оврагахъ (??).

Umbelliferae.

272. *Eryngium planum* L. Открытыя мѣста; часто ( $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ).
273. *Thrinia Henningii* Hoffm. Каменистыя возвышенности, не часто ( $\frac{1}{\cdot}$ ).
274. *Falcaria Rivini* Host. Поля, дороги, межи и т. д. Часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ).
275. *Aegopodium Podagraria* L. Часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ).
276. *Carum Carvi* L. Оч. часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ).
277. *Pimpinella saxifraga* L. а) *poterifolia* Koch. Часто. б) *dissectifolia* Koch. Часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ). г) *major* Koch. Рѣже предыдущихъ.
278. *Sium latifolium* L. По р. Воронежу, часто (Подгорное, Грязное и др. м.)  $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ .
279. *Sium cicutaefolium* L. Gmd. Сырой обрывъ бл. Ситной ( $\frac{1}{\cdot}$ ); сырьи склоны бл. Паниковца.
280. *Cicuta virosa* L. Дов. рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{1}{\cdot}$ ). Болота и стоячія заливныи воды по Воронежу (Подгорное и Бѣлоколодзкое); заливныи воды бл. Казачьяго; по р. Рѣшцу находилъ г. Исаевъ.
281. *Oenanthe Phellondrium* L. По Дону рѣдко (стоячія воды бл. Казачьяго), по Воронежу оч. часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ) \*..
282. *Libanotis montana* Crantz. Часто ( $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ) (чаще встрѣчается а) *typica*, но также и *sibirica* P. M. E.)
283. *Seseli coloratum* Ehrh. По сухимъ кустарникамъ, не рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ ).
284. *Cnidium venosum* Koch. По сухимъ кустарникамъ, рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$ ).
285. *Bupleurum falcatum* L. Открытыя возвышенныя мѣста, не рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$ ).
286. *Selinum carvifolia* L. По сырымъ лѣсамъ и кустарникамъ (Муравлянскій лѣсъ)  $\frac{1}{\cdot}$ .
287. *Conioselinum Fischeri* Wietg. Болотистыя мѣста въ лѣсахъ, около ручьевъ и т. д. (Нечаевка, Терновое, Викулинскій лѣсъ, Муравлянное)  $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ .

\*<sup>1</sup>) *Aetus elata* Friedl. найдена мною въ горномъ оврагѣ бл. Паниковца (См. Цингера Сборн. свѣд. стр. 195). Елецкало у. (Тамъ, по ошибкѣ, указанъ Задонскій уѣздъ).

288. *Angelica sylvestris L.* β) *decurrens R.* Часто, по сырьимъ оврагамъ и т. д. ( $\frac{1}{2}$ ).
289. *Archangelica officinalis L.* По сырьимъ лѣсамъ; разсѣяно ( $\frac{1}{2}$ ), преимущ. по Воронежу (Подгорное, Ситная).
290. *Peucedanum palustre Moench.* По берегамъ Воронежа ( $\frac{1}{2}$ ).
291. *P. Alsaticum L.* Сухие кустарники, лѣса и открытые мѣста; не рѣдко ( $\frac{1}{2}$ ).
292. *P. Oreoselinum L.* Открытые и поросшія кустарникомъ возвышенности; не рѣдко ( $\frac{1}{2}$ , рѣже  $\frac{1}{3}$ ).
293. *Pastinaca sativa L.* Часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{3}$ ).
294. *Heracleum Sibiricum L.* α) *typicum Kaufm.* Часто ( $\frac{1}{2}$ ). β) *longifolium Koch.* рѣже.
295. *Laserpitium Pruthenicum L.* По сухимъ кустарникамъ, часто ( $\frac{1}{2}$ ).
296. *Daucus Carota L.* — По берегу Дона, разсѣяно ( $\frac{1}{2}$ ); обрывы Моховатаго верха  $\frac{1}{2}$  и почти  $\frac{1}{3}$ .
297. *Torilis Anthriscus Gmel.* Сухие кустарники, лѣса, сады; часто ( $\frac{1}{2}$ ).
298. *Anthriscus sylvestris Hoffm.* Лѣса, сады, кустарники; часто ( $\frac{1}{2}$ ).
299. *Chaerophyllum bulbosum L.* Оврагъ бл. Нечаевки ( $\frac{1}{2}$ ).
300. *Conium maculatum L.* По мусорнымъ мѣстамъ ( $\frac{1}{2}$ ).

Cornaceae.

301. *Cornus sanguinea L.* По лѣсамъ и кустарникамъ (Муравлянскій лѣсъ, Викулинскій, Скитскій л.)  $\frac{1}{2}$ .

Caprifoliaceae.

302. *Adoxa Moschatellina L.* По садамъ и лѣсамъ (подъ ли-  
пою и дубомъ)  $\frac{1}{2}$ .
303. *Viburnum Opulus L.* Часто ( $\frac{1}{2}$ ).
304. *Lonicera Xylosteum L.* По лѣсамъ и садамъ ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{3}$ )  
(Викулинскій и Скитскій л.).

Rubiaceae.

305. *Asperula tinctoria L.* По лѣсамъ и садамъ, часто ( $\frac{1}{2}$   
и  $\frac{1}{3}$ ).

306. *A. aparine* L. Сырыя мѣста по ручьямъ; часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
307. *A. odorata* L. По тѣнистымъ и гористымъ лѣсамъ, не  
часто (Ситная и Бѣлоколодзкое ( $\frac{++}{++}$ ); Муравляное, Сить ( $\frac{+}{+}$ )).  
308. *A. galiooides* M. B. Известковый обрывъ Быка ( $\frac{++}{++}$ ).  
309. *A. cynanchica* L. Известковыя и песчаныя высоты бл.  
Хлѣвнаго ( $\frac{++}{++}$ ); каменоломни бл. Ельца ( $\frac{++}{++}$ ).  
310. *Galium palustre* L. По сыр. мѣстамъ и болотамъ, час-  
то ( $\frac{++}{++}$ ).  
311. *G. Aparine* L. Часто, по садамъ, кустарникамъ etc.  
а) *typicum* б) *Vaillantii* Koch. Чаще предыдущей формы.  
312. *G. verum* L. Обыкновенно ( $\frac{++}{++}$ ).  
313. *G. Mollugo* L. Обыкновенно ( $\frac{++}{++}$ ).  
314. *G. boreale* L. По лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
315. *G. rubrooides* L. По лѣсамъ и кустарникамъ, не рѣдко  
( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).

Valerianeae.

316. *Valeriana officinalis* L. По сырьимъ мѣстамъ и т. д.,  
часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ); на сухихъ, возвышенныхъ мѣстахъ встрѣчают-  
ся цѣльно и узколистные, низкорослые и ранѣе зацвѣтающіе (съ  
 $\frac{1}{2}$  июня и раньшѣ), экземпляры: *v. montana* m. (*v. angustifolia*  
Tausch?).

Dispaceae.

317. *Knautia arvensis* Coult. а) *typica* б) *integrifolia*.  
Часто ( $\frac{+}{+}$ ).  
318. *Succisa pratensis* Moench. По кустарникамъ и лѣсамъ,  
часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
319. *Scabiosa ochroleuca* L. Открытая мѣста, луга и т. д.  
Не рѣдко ( $\frac{++}{++}$ ).  
320. *Dipsacus pilosus* L. Сыре мѣсто въ горномъ лѣсу бл.  
Паникова ( $\frac{+}{+}$ ; 16-го июля въ полн. цвѣту. Цвѣты бѣлые.

Compositae.

321. *Eupatorium cannabinum* L. Мокрые обрывы близъ Бѣ-  
локолодзкаго и Паникова ( $\frac{++}{++}$ ).  
322. *Petasites spurius* Bchb. Наносный песокъ по р. Черня-  
евкѣ ( $\frac{++}{++}$ ). Цвѣтетъ, кажется, рѣдко.

323. *Tussilago farfara* L. На глине, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
324. *Aster Amellus* L.  $\alpha)$  *vulgaris* Czernajew.  $\beta)$  *major* Ledebour. Возвышенные кустарники и открытые места ( $\frac{+}{+}$ ).
325. *Erigeron acris* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ). Въ лѣсахъ встречается иногда разновидность съ очень удлиненными рѣдкими цветоножками и нѣсколько болѣе длинными язычками.
326. *E. Canadensis* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
327. *Galatella punctata* Lindl.  $\gamma)$  *insculpta* DC. Возвышенный кустарникъ бл. Нечаевки ( $\frac{+}{+}$ ).
328. *Galatella dracunculoides* Lalem.  $\beta)$  *discoidea* Lal. По сухимъ и возвышеннымъ лѣсамъ и кустарникамъ, рѣдко (Викулинский лѣсъ ( $\frac{+}{+}$ ), Нечаевка ( $\frac{+}{+}$ )) 13 авг. нач. цвет.
329. *Solidago Virga aurea* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
330. *Inula Helenium* L. По сырьемъ, открытымъ и тѣнистымъ склонамъ, ручьямъ и оврагамъ — и  $\frac{+}{+}$ . (Моховатый верхъ, Дерновое, Викулинский лѣсъ, Муравляное; Паниковецъ).
331. *I. hirta* L. Сухие лѣса и кустарники, часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
332. *I. Salicina* L.  $\alpha)$  *genuina* Lindem.  $\beta)$  *subhirta* C.A.M. Сухие лѣса и кустарники, часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
333. *I. Britannica* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
334. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. Сырыя пашни, дороги, берега рекъ и т. д.  $\frac{++}{++}$  (Ржавчикъ, улицы Задонска, Кошары и др. м.).
335. *Bidens tripartita* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
336. *B. cernua* Wild. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).  $\alpha)$  *typica*  $\beta)$  *radiata* DC. (особенно часто).
337. *Filago arvensis* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
338. *Gnaphalium dioicum* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
339. *G. sylvaticum* L.  $\beta)$  *macrostachium* Ledeb. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
340. *G. uliginosum* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
341. *Helychrysum arenarium* DC. По возвышеннымъ открытымъ и покрытымъ кустарникомъ местамъ; не рѣдко ( $\frac{++}{++}$ ). (Моховатый верхъ, Нечаевка, Воскресенка, Казачье etc.).
342. *Artemisia vulgaris* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
343. *A. Absinthium* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
344. *A. Scoparia* W. et K. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
345. *A. campestris* L.  $\alpha)$  *genuina*  $\beta)$  *sericea* Fries. Кажется, только по песчанымъ и глинистымъ местамъ ( $\frac{++}{++}$ ).

346. *A. Austriaca* Iacq. На всемъ Югѣ уѣзда  $\frac{++}{++}$ ; на Сѣверѣ не встрѣчалось. Кажется, только на глинистой почвѣ.
- 346\*. *A. maritima* L.?  $\beta$ ) *fragrans* Led. Безцвѣтные экземпляры бл. Хлѣвнаго ( $\frac{++}{++}$ ). За точность опредѣленія не ручаюсь.
347. *A. procera* Wild. По заливнымъ мѣстамъ Дона и его притоковъ ( $\frac{++}{++}$ ). Часто.
348. *Artemisia Dracunculus* L. По заливнымъ берегамъ Дона ( $\frac{++}{++}$ ).
349. *Tanacetum vulgare* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
350. *Achillea cartilaginea* Ledeb. Сырые лѣса и луга по р. Воронежу.
351. *A. Millefolium* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
352. *A. nobilis* L. Открытые и возвышенныя мѣста, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
353. *Anthemis tinctoria* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
354. *A. Cotula* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
355. *Leucanthemum vulgare* Lem. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
356. *Matricaria Chamomilla* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
357. *M. inodora* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
358. *Pyrethrum corymbosum* L. По лѣсамъ, садамъ и кустамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
359. *Senecio vulgaris* L. По мусорнымъ мѣстамъ, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
360. *S. Jacobaea* L. Оч. часто ( $\frac{+}{+}$ ); формы, встрѣчающіяся на известковыхъ высотахъ, болѣе покрыты шерстистыми волосками.
361. *S. campestris* D. C. По возвышеннымъ, поросшимъ кустарникомъ и открытымъ, мѣстамъ; не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).
362. *S. vernalis* W et K. По паровымъ полямъ, изрѣдка. 7-го мая—нач. цвѣт.
363. *S. rapistroides* DC. Найденъ на сыромъ мѣстѣ близъ ручья около Сергиевки ( $\frac{+}{+}$ ).
364. *S. paludosus* L.  $\alphatomentosus Koch. (*S. Sodleri* Lang.) Болота по р. Воронежу, изрѣдка ( $\frac{+}{+}$ ).$
365. *Echinops shaerocephalus* L. По открытымъ возвышеннымъ мѣстамъ; часто ( $\frac{++}{++}$  и  $\frac{+}{+}$ ).
366. *E. Ritro* L. По каменистымъ обрывамъ, мѣстами (Быкъ, берегъ Дона бл. Кошаръ, Хлѣвное ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
367. *Carlina vulgaris* L. По кустарникамъ ( $\frac{+}{+}$ ).

368. *Centaurea Cyanus* L. Часто (‡‡).
369. *C. Jacea* L. Часто (‡‡) α) *genuina* Koch. γ) *lacera* Koch. β) *pratensis* Koch. Встрѣчается также покрытый ключевидными волосами (*lanata*).
370. *C. phrygia* L. По гористымъ кустарникамъ и лѣсамъ (Викулинскій лѣсъ, Муравлянскій лѣсъ) (÷). *Variat follis lace-ratis* (Муравлянскій лѣсъ).
371. *C. austriaca* W. Тамъ-же (÷).
372. *C. Scabiosa* L. Часто (‡‡). Встрѣчается (очень рѣдко) съ бѣлыми цвѣтами (на известковой почвѣ: Моховатый верхъ).
373. *C. Biebersteinii* DC. По открытымъ мѣстамъ, часто (‡‡).
374. *C. Marschalliana* Spreng. Известковые склоны Моховатаго верха (÷); склоны около Нечаевки (—).
375. *Carduus nutans* L. Часто (‡‡).
376. *C. crispus* L. Часто (‡‡).
377. *C. hamulosus* Ehr. Известковые обрывы Моховатаго верха (÷).
378. *Cirsium arvense* L. Часто (‡‡).
379. *C. eriophorum* Scop. Открытые мѣста, обрывы, дороги etc.; часто (÷ и ‡‡).
380. *C. lanceolatum* Scop. По мусорнымъ мѣстамъ, часто (÷ и ‡‡).
381. *C. pannonicum* Gaud. Холмистый кустарникъ бл. Нечаевки (÷).
382. *C. heterophyllum* All. α) *integrifolium* β) *heterophyllum* Kaufm. Въ лѣсахъ и холмистыхъ кустарникахъ (Нечаевка, Моховатый верхъ) ÷.
383. *C. oleraceum* Scop. Сырые берега лѣсныхъ ручьевъ (Викулинскій лѣсъ, Муравлянскій, Скитскій).
384. *Lappa major* Gaestn. Мѣстами (÷) (и *S. intermedia* Reichb. f.).
385. *L. minor* DC. Мѣстами (÷).
386. *L. tomentosa* Lam. Оч. часто (‡‡).
387. *Serratula tinctoria* L. По лѣсамъ и кустарникамъ часто (÷). Var. *foliis omnibus fere pinnatisectis*.
388. *S. heterophylla* Desf. Холмистый кустарникъ близъ Нечаевки и въ друг. мѣстахъ (÷).

389. *S. coronata* L. Найденъ только одинъ экземпляръ въ холмистомъ кустарнике близъ Нечаевки.
390. *Jurinae a mollis* Rchbch. а) *genuina* β) *integrifolia*. Известковые склоны Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ). Головокъ 1—3.
391. *J. Pollichii* DC. Тамъ-же.
392. *Onopordon Acanthium* L. Глинистые и песчаные обрывы, мусорные мѣста и т. д., преимущественно въ Юговосточной части уѣзда (Задонскъ, Хлѣвное, Борки, Бестужево и др. м.).
393. *Lampsana communis* L. По тѣнистымъ лѣсамъ  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ . (Сергіевка, Подгорное, Ситова, Муравленскій лѣсъ).
394. *Cichorium Intybus* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
395. *Hypochaeris maculata* L. По кустарникамъ и возвышеннымъ мѣстамъ ( $\frac{1}{2}$ ), часто.
396. *Leontodon autumnalis* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
397. *L. hastilis* L. α) *vulgaris* Koch. Часто ( $\frac{1}{2}$ ).
398. *Tragopogon major* L. Известковый склонъ Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ).
399. *T. pratensis* L. α) *typicus*. Часто ( $\frac{1}{2}$ ). γ) *eriophorus* D. C. (Возвышен. мѣсто бл. Бѣлоколодзскаго).
- 400 а. *T. orientalis* L. f. *nana*, *glaucescens*. Известков. высоты бл. Хлѣвнаго ( $\frac{1}{2}$ ).
- 400 б. *T. floccosus* L. По берегамъ р. Воронежа.
401. *Scorzonera purpurea* L. По открытымъ и поросшимъ кустарникомъ склонамъ; не рѣдко (Нечаевка, Моховат. верхъ). ( $\frac{1}{2}$ ).
402. *S. humilis* L. По гористымъ мѣстамъ ( $\frac{1}{2}$ ), не рѣдко (Нечаевка, Моховатый верхъ).
403. *S. Hispanica* L. β) *glastifolia* Wallr. Известковые склоны Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ).
404. *S. Taurica* M. B. Известковый обрывъ Моховатаго верха ( $\frac{1}{2}$ ).
405. *Picris hieracioides* L. По кустарникамъ и т. д. Часто ( $\frac{1}{2}$ ).
406. *Lactuca Scariola* L. Сорные мѣста, дороги и т. д. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
407. *Chondrilla juncea* L. α) *angustifolia* Lindem. (Prodrom, 128). β) *latifolia* Koch. (=Ch. *graminea* M. B. ?). Связаны многими переходными формами, представляющими также признаки γ. *Spinulosa* Koch. Известков. склоны Моховатаго верха ( $\frac{2}{3}$ ).

408. *Taraxacum officinale* L. Очень часто ( $\frac{++}{++}$ ).
409. *Sonchus oleraceus* L. На воздыланной и мусорной почвѣ. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
410. *S. asper* W. На поляхъ, въ лѣсахъ и т. д. Не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).
411. *S. arvensis* L.  $\alpha)$  *typicus*. Часто  $\beta)$  *uliginosus* Trautf. Сырыя мѣста въ Бѣлоколодскомъ лѣсу ( $\frac{++}{++}$ ).
412. *S. palustris* L. Горное болото бл. Паниковца ( $\frac{+}{+}$ ).
413. *Crepis tectorum* L. Очень часто ( $\frac{++}{++}$ ).
414. *C. praemorsa* Tausch. По лѣснымъ лугамъ, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).
415. *C. Sibirica* L. По гористымъ лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
416. *C. rigida* W. et K. Рѣдко. На кустарниковомъ известковомъ склонѣ Моховатаго верха ( $\frac{+}{+}$ ).
417. *Hieracium pilosella* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
418. *H. bifurcum* M. a B. K. По лѣснымъ лугамъ, мѣстами ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
419. *H. praealtum* Koch. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
420. *H. Nestleri* Vill. Часто ( $\frac{+}{+}$ ).
421. *H. pratense* Tausch. Часто ( $\frac{+}{+}$ ).
422. *H. umbellatum* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
423. *H. echioides* W. et K.  $\alpha)$  *genuinum*.  $\beta)$  *Ruprechti* Lindem. (Prodrom Fl. Cherson 132) (*H. albonicinereum* Rupr.). По гористымъ кустарникамъ и открытымъ мѣстамъ, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ )<sup>1)</sup>.

Ambrosiaceae.

424. *Xanthium strumarium* L. По дорогамъ, берегамъ рѣкъ и т. д. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
425. *X. spinosum* L. Песчаный обрывъ и оврагъ бл. Хлѣбнаго  $\frac{++}{++}$ ; въ друг. мѣстахъ рѣдко и разсѣянно ( $\frac{+}{+}$ ).

Campanulaceae.

426. *Campanula Sibirica* L. Открытые мѣста, поля etc. Часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).
427. *C. glomerata* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).

<sup>1)</sup> Въ спискѣ г. Гинальского показыв. *H. cymosum*.

428. *Cervicaria L.* Довольно часто, по гористымъ кустарникамъ и лѣсамъ (обыкнов. —, рѣдко  $\frac{1}{\cdot}$ ).

429. *C. Trachelium L.*  $\beta)$  *dasycarpa Koch.* По лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{1}{\cdot}$ ).

430. *C. rapunculoides L.* По лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{1}{\cdot}$ ).

431. *C. latifolia L.* Тѣнистые горные лѣса (Скитский лѣсъ, Подгорное, Ситово)  $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{1}{\cdot\cdot}$ .

432. *C. persicifolia L.* Часто ( $\frac{1}{\cdot}$ ).

433. *C. patula L.* Обыкновенно ( $\frac{1}{\cdot\cdot}$ ).

434. *C. rotundifolia L.* Обыкновенно ( $\frac{1}{\cdot\cdot}$ ).

435. *Adenophora polymorpha Led.* По возвышеннымъ кустарникамъ и лѣсамъ, не рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$ ).

Pyrolaceae,

436. *Pyrola rotundifolia L.* Безцвѣтные экземпляры найдены въ Викулинскомъ лѣсу, на сыромъ склонѣ глубокаго и узкаго оврага; цвѣтущіе ( $\frac{1}{\cdot}$ ) найдены только въ мшистомъ болотѣ Муравлянского лѣса; 21-го июня въ полномъ цвѣту. (Указана также въ спискѣ г. Гинальского).

437. *P. secunda L.* Найдены цвѣтущіе экземпляры (14-го июня) въ указанномъ оврагѣ Викулинского лѣса.

Lentibularieae.

438. *Utricularia vulgaris L.* Заливныя стоячія воды бл. Казачьяго ( $\frac{1}{\cdot}$ ); въ р. Рѣшѣ находилъ г. Исаевъ.

Oleaceae.

439. *Fraxinus excelsior L.* По лѣсамъ, не рѣдко (— и  $\frac{1}{\cdot}$ ).

Monotropeae.

440. *Monotropa Hypopithys L.*  $\alpha)$  *glabra Koch.* Рѣдко; тѣнистая горная роща Яблонова верха бл. Нечаевки. У нашихъ экз. завязь покрыта не «*punctis minutis*» (Koch, Synops.), а крупными, почти бородавчатыми, возвышениями.

Asclepiadaceae.

441. *Cynanchum vincetoxicum R. Br.* По кустарникамъ, лѣсамъ, оврагамъ и т. д. Часто ( $\frac{1}{\cdot}$ ); v. *laxum Murr.* Тѣнистая мѣста Муравлянск. лѣса.

Gentianaceae.

442. *Menyanthes trifoliata* L. Болота по р. Воронежу, довольно рѣдко (Подгорное).

443. *Gentiana Pneumonanthe* L. По возвышеннымъ лѣсамъ и кустарникамъ, довольно часто  $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\circ}{\circ}$  (Моховатое, Скитский лѣсъ, Казачье).

444. *G. cruciata* L. По возвышеннымъ кустарникамъ и опушкамъ лѣсовъ ( $\frac{1}{\cdot}$ ). (Моховатое, Муравлянскій лѣсъ).

445. *Erythraea ramosissima* Pers. (E. pulchella Fr.). Заливной лугъ р. Воронежа бл. Подгорного ( $\frac{1}{\cdot}$ ). 8-го июля въ полномъ цвету.

Polemoniaceae,

446. *Polemonium coeruleum* L. По лѣсамъ и кустарникамъ, не рѣдко ( $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\circ}{\circ}$ ).

Convolvulaceae.

447. *Convolvulus arvensis* L. Обыкновенно ( $\frac{\circ}{\circ}$ ).

448. *Calystegia sepium* R. Br. По берегамъ рекъ, часто ( $\frac{\circ}{\circ}$ ).

Cuscuteae.

449. *Cuscuta major* DC. Преимущ. на крапивѣ и ивахѣ, не рѣдко ( $\frac{\circ}{\circ}$ ).

450. *C. lupuliformis* Krock. Сыре, тѣнистое мѣсто по берегу Воронежа бл. Бѣлоколодзскаго, на *Rubus caesius* ( $\frac{\circ}{\circ}$ ).

Boraginaceae.

451. *Echium vulgare* L. По мусорнымъ мѣстамъ, дорогамъ, парковымъ полямъ etc., часто ( $\frac{\circ}{\circ}$ ).

452. *E. rubrum* Jacq. По открытымъ возвышеннымъ лугамъ, не рѣдко (Нечаевка, Моховатый верхъ)  $\frac{1}{\cdot}$ .

453. *Nonnaea pulpa* DC. Открытые мѣста, парковыя поля, сады и др. мѣста, часто (особенно по берегу Дона)  $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\circ}{\circ}$ .

454. *Symphytum officinale* L. а) *typicum*; б) *lanceolatum* Weinm. По сырьимъ мѣстамъ (устье Черняевки, болото близъ Задонска, Казачье)  $\frac{1}{\cdot}$ .

455. *S. asperum* Lep. Сырыя мѣста по р. Воронежу (льсь бл. Ситной; болото бл. Троицкаго, Липецк. у.)  $\frac{1}{\text{--}}$ .
456. *Lithospermum arvense*. L. По паровымъ полямъ, мѣжамъ и т. д., часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
457. *L. officinale* L. Гористый кустарникъ бл. Ямокъ ( $\frac{1}{\text{--}}$ ).
458. *Pulmonaria officinalis* L. Часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
459. *P. azurea* Bess. (*P. angustifolia* Rehb.). По возвышеннымъ лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
460. *Myosotis palustris* L. По болотамъ, мѣстами (Казачье и др.)  $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ .
461. *M. caespitosa* Schultz. По сырымъ мѣстамъ часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
462. *M. sylvatica* Hoffm. v. *alpestris* Koch. По лѣсамъ, кустарникамъ и открытымъ возвышенностямъ, часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
463. *M. intermedia* Link. Часто ( $\frac{1}{\text{--}}$ ).
464. *M. stricta* Link. Часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
465. *M. sparsiflora*. По влажнымъ мѣстамъ, часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
466. *Echinospermum Lappula* Lehm.  $\alpha$ ) *typicum*. Очень часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
467. *Asperugo procumbens* L. По мусорнымъ мѣстамъ (Нечеевка, г. Задонскъ)  $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ .
468. *Cynoglossum officinale* L. Часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ). На известнякѣ Моховатаго верха найденъ экземпляръ съ бѣлыми цвѣтами.

Solaneae.

469. *Datura Stramonium* L. Мусорные мѣста по деревнямъ (Гразное, Борки, Подгорное и др.) ( $\frac{1}{\text{--}}$ ).
470. *Hyoscyamus niger* L. Часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
471. *Solanum Dulcamara* L.  $\alpha$ ) *typicum*. Близъ Ситной ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ )  
 $\beta$ ) *Persicum* Trautf (*S. Persicum* DC). По сырымъ мѣстамъ, часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
472. *Solanum nigrum* L.  $\alpha$ ) *vulgare* C et G. Мѣстами ( $\frac{1}{\text{--}}$ ).

Scrophulariaceae.

473. *Verbascum Lychnitis* L. Часто ( $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).
474. *V. nigrum* L. По возвышеннымъ мѣстамъ ( $\frac{1}{\text{--}}$ ).
475. *V. orientale* MB. Так же ( $\frac{1}{\text{--}}$  и  $\frac{\text{++}}{\text{--}}$ ).

476. *V. Thapsus L.* Довольно рѣдко (мусорное мѣсто бл. Подгорного —; песчаные и каменистые склоны бл. Паниковца (—)).
477. *V. Phoeniceum L.* Гористыя лѣсные и открытыя мѣста, не рѣдко (—<sup>1)</sup>).
478. *Linaria vulgaris Mill.* Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
479. *L. genistifolia Mill.* По известковому склону Моховатаго верха, довольно рѣдко и разсѣянно (—); на пескѣ въ Липецкомъ у. часто и  $\frac{++}{++}$ .
480. *L. minor L.* На пескѣ по берегу Дона, довольно рѣдко (Кошары, Хлѣвное) — и  $\frac{-}{-}$ .
481. *Scrophularia nodosa L.* По ручьямъ etc. Часто ( $\frac{-}{-}$ ).
482. *S. alata Gil.* Горный ручей бл. Паниковца  $\frac{++}{++}$ ; въ другихъ мѣстахъ рѣдко и разсѣянно (—).
483. *Gratiola officinalis L.* Въ р. Воронежъ бл. Подгорного ( $\frac{-}{-}$ ).
484. *Limosella aquatica L.* Высохший иль заливныхъ водъ по Дону, Чернавкѣ и Воронежу ( $\frac{-}{-}$ ).
485. *Veronica Spuria L.* По кустарникамъ и лѣсамъ, не рѣдко ( $\frac{-}{-}$ ).
486. *V. longifolia L.* По ручьямъ, обрывамъ и т. д., часто ( $\frac{-}{-}$ ), <sup>2)</sup> *glabra Koch.* По берегамъ Дона и Воронежа ( $\frac{++}{++}$ ).
487. *V. spicata L.* Лѣсные и открытыя возвышенныя мѣста ( $\frac{-}{-}$ ).
488. *V. incana L.* Такжে ( $\frac{-}{-}$ ).
489. *V. latifolia L.* Часто ( $\frac{-}{-}$ ).
490. *V. Austriaca L.* v. *pinatifida Koch.* Кустарники и лѣса, не рѣдко ( $\frac{-}{-}$ ).
491. *V. serpyllifolia L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
492. *V. Chamaedrys L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
493. *V. verna L.* Паровые поля ( $\frac{++}{++}$ ).
494. *V. Beccabunga L.* Сырыя, преимущ. песчаныя мѣста ( $\frac{-}{-}$ ).
495. *V. Anagallis L.* Тамъ-же ( $\frac{-}{-}$ ).
496. *V. scutellata L.* Сырыя мѣста по Дону и Воронежу ( $\frac{++}{++}$ ) <sup>3)</sup>.
497. *Euphrasia officinalis L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
498. *E. serotina Lam.* (*Odontites serotina Rchb.*). Не часто; по сухимъ, преимуществ. песчанымъ и глинистымъ мѣстамъ.

<sup>1)</sup> Въ спискѣ г. Гинзальского указывается еще *V. blattaria*.

<sup>2)</sup> Въ спискѣ г. Гинзальского указана сверхъ того *V. officinalis*.

499. *Rhinanthus Crista galli L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
500. *Pedicularis comosa L.* Часто ( $\frac{-}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
501. *Melampyrum nemorosum L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
502. *M. cristatum L.* По кустарникамъ и лѣсамъ, особенно возвышеннымъ ( $\frac{-}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
503. *M. arvense L.*  $\beta$ ) *argyrocomum Fisch.* Известковые склоны, открытые и кустарниковые, Моховатаго верха ( $\frac{++}{++}$ ).  
504. *M. laciniatum Kosch. et Zing.* (Тульск. Флора с. 86). Боръ бл. Паникова. (Мнѣ вспоминается, что гдѣ то растеніе это мнѣ попалось и въ Задонскомъ у., но гдѣ именно, не припомню) <sup>1)</sup>.

Orobanchaeae.

505. *Orobanche elatior Satt.* Тѣнистый лѣсъ по Дону бл. Паникова ( $\frac{++}{++}$ ); изрѣдка въ разн. мѣстахъ Зад. уѣзда. Высотою до 2'.  
506. *O. alba Steph.* По высокимъ, тѣнистымъ и обнаженнымъ, каменистымъ мѣстамъ (Нечаевка, Моховатый верхъ)  $\frac{-}{+}$ . Какъ кажется, исключительно на *Salvia dumetorum Andrz.*  
507. *Lathraea Squamaria L.* По тѣнистымъ лѣсамъ, изрѣдка (Муравлянскій лѣсъ).

Labiateae.

508. *Mentha arvensis L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
509. *M. sativa L.*  $\beta$ ) *gentilis Reichb.* Горный ручей близъ Паникова ( $\frac{-}{+}$ ).  
510. *Lycopus Europaeus L.* Мѣстами, по берегамъ прудовъ и ручьевъ ( $\frac{++}{++}$ ).  $\alpha$ ) *glaber Benth.*  $\beta$ ) *procerior Presl.*  
511. *L. exaltatus L. f.* Тамъ же; чаще предыдущаго вида.  
512. *Thymus Marschallianus Willd.* По сухимъ холмамъ и склонамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ); на известковой почвѣ, изрѣдка, встречается съ бѣлыми цветами (Быкъ).  
513. *T. odoratissimus M. a B.* Известковый солнечный высоты бл. Хлѣбнаго ( $\frac{++}{++}$ ). У нашихъ экз. не только листья „*glandulis numerosis densis magnis impressis*“ (Ледебуръ), но и чашечки покрыты темнооранжевыми желѣзками.

<sup>1)</sup> Въ нашихъ мѣстахъ оно является, какъ мнѣ кажется, характернымъ для существующихъ или бывшихъ, хвойныхъ лѣсовъ.

514. *Calamintha Acinos L.* По лесамъ и кустарникамъ, часто ( $\div$ ).
515. *Clinopodium vulgare L.* Тамъ же, часто ( $\div$  и  $\frac{++}{++}$ ).
516. *Origanum vulgare L.* Тамъ же, часто ( $\div$  и  $\frac{++}{++}$ ).
517. *Salvia dumetorum Andrz.* (*Salvia pratensis*  $\beta$  *parviflora* Lindem.,  $\beta$  *dumetorum* Trautv.). — Паровые поля, межи, луга и т. д., часто ( $\div$  и  $\frac{++}{++}$ ).
518. *S. pratensis L.* ( $\alpha$ ) *typica*. Рѣже предыдущаго вида и обыкновенно разсѣянно ( $\frac{+}{+}$ , рѣдко  $\div$ ). Весьма явственное различие и отсутствие переходныхъ формъ (по крайней мѣрѣ у насть) говорить за «видовую» равноправность *S. pratensis* и *dumetorum*.
519. *S. verticillata L.* По открытымъ солнечнымъ обрывамъ и по берегу Дона, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
520. *S. nutans L.* Каменистые обрывы Моковатаго верха и Быка ( $\div$ ).
521. *S. sylvestris L.* Сплошной почти полосою сопровождаетъ теченіе Дона ( $\frac{++}{++}$ ); въ другихъ мѣстахъ рѣже.  $\beta$ ) *albiflora* *m.* Отъ типической формы отличается *бѣлыми*, въ  $1\frac{1}{2}$ —2 раза *меньшими* цветами, *неокрашенными*, зелеными, прицвѣтниками и нѣсколько болѣе длинными столбиками. Было найдено нѣсколько разъ вмѣстѣ съ типическою формою, но въ одномъ только мѣстѣ, по дорогѣ изъ Кошарь въ Тюнино ( $\div$ ).
522. *Nepeta nuda L.*  $\beta$ ) *pannonica* *Jacq.* Гористые кустарники, часто ( $\div$ ).
523. *N. Cataria L.*  $\alpha$ ) *citriodora*.  $\beta$ ) *inodora*. По мусорнымъ мѣстамъ ( $\div$  и  $\frac{++}{++}$ ).
524. *Glechoma hederacea L.* Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).
525. *Dracocephalum thymiflorum L.* По паровымъ полямъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
526. *D. Ruyschiana L.* По сухимъ кустарникамъ, не рѣдко ( $\div$ ).
527. *Lamium maculatum L.* По тѣнистымъ лѣсамъ ( $\frac{++}{++}$ ).
528. *Galeopsis Ladannii L.* Паровые поля, очень часто ( $\frac{++}{++}$ ).
529. *G. tetrahit L.* По сырьимъ мѣстамъ въ лѣсахъ и оврагахъ (Ситная, Бѣлоколодское)  $\div$ ; на пашняхъ рѣдко и только мѣстами (Дерновое).
530. *G. versicolor Court.* По пашнямъ, но разсѣян и рѣдко. (Муравлянное и др. м.).

531. *Stachys sylvatica* L. Тѣнистые лѣса ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
532. *S. palustris* L. Часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
533. *S. recta* L. По холмистымъ кустарникамъ, не рѣдко ( $\frac{1}{2}$ ).
534. *S. annua* L. По паровымъ полямъ, очень часто ( $\frac{2}{3}$ ).
535. *Betonica officinalis* L. Оч. часто ( $\frac{1}{2}$ ).
536. *Leonurus Cardiacus* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
537. *L. Marrubiastrum* L. Заливной лѣсъ около Подгорнаго; сырья поля бл. Романова Липецкаго уѣзда ( $\frac{1}{2}$ ).
538. *Scutellaria galericulata* L. По берегамъ рѣкъ и прудовъ, часто ( $\frac{2}{3}$ ).
539. *S. hastifolia* L. Заливные кустарники и луга по теченію Воронежа  $\frac{1}{2}$  (Подгорное, Ситная).
540. *S. altissima* L. Сырой горный лѣсъ бл. Бѣлоколодскаго ( $\frac{1}{2}$ ).
541. *Phlomis tuberosa* L. По мусорнымъ мѣстамъ и т. д., часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{3}$ ).
542. *Brunella vulgaris* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
543. *B. grandiflora* Moench. По холмистымъ кустарникамъ, нерѣдко (Нечаевка, Сергіевка и др. м.).
544. *Ballota nigra* L.  $\alpha)$  *typica* По мусорнымъ мѣстамъ, часто ( $\frac{2}{3}$ ).
545. *Ajuga Genevensis* L. По лугамъ, лѣсамъ и т. д.; часто ( $\frac{2}{3}$ ).
546. *Teucrium Scordium* L. Сырое тѣнистое мѣсто на лѣсномъ обрывѣ берега Воронежа бл. Бѣлоколодскаго ( $\frac{1}{2}$ ). 20-го июля, въ началѣ цвѣтенія.

Primulaceae.

547. *Primula officinalis* Jacq. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
548. *Androsace septentrionalis* L. Часто ( $\frac{2}{3}$ ).
549. *A. elongata* L. Паровые поля, часто ( $\frac{2}{3}$ ).
550. *Naumburgia Thyrsiflora* Rchb. Стоячія заливныя воды бл. Казачьяго ( $\frac{1}{2}$ ).
551. *Lysimachia vulgaris* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).
552. *L. nummularia* L. Оч. часто ( $\frac{2}{3}$ ).

Plantagineae.

553. *Plantago major* L. Оч. часто (♀♀).

554. *P. media* L. Оч. часто (♀♀).

555. *P. lanceolata* Оч. часто (♀♀).

Amaranthaceae.

556. *Amaranthus retroflexus* L. На мусорныхъ мѣстахъ, часто (♀♀).

Chenopodeae.

557. *Salsola Kali* L. На пескѣ, на днѣ оврага бл. Хлѣвнаго (♀♀; въ друг. мѣстахъ разсѣянно).

558. *Polycnemum arvense* L. Песчаные и известковые обрызы Моховатаго верха и Хлѣвнаго; паровыя поля между Нечаевкою и Кошарами съ большими напосами песку (♀♀).

559. *Blitum virgatum* L. По обрывамъ, сырьемъ мѣстамъ и т. д.; часто (♀♀).

560. *B. glaucum* Koch. По заливному песку Дона, часто (♀♀).

561. *B. rubrum* K. На пескѣ и иль по берегу Дона, мѣстами (♀♀).

562. *Atriplex nitens* Rebenst. По берегу Дона цѣлыми чаща-ми (♀♀).

563. *A. patula* L. β) *denticulata* Fenzl. Не рѣдко (♀♀). Встрѣчается въ двухъ формахъ: α) почти соверш. свѣтлозеленая, раскидистая и β) *canescens*, *coarctata*.

564. *A. rosea* L. (A. *Laciniata* L. *rosea* Trautv.) По мусор-нымъ мѣстамъ и каменистымъ обрывамъ (улиц. Задонска, Патри-аршее, Боринские заводы, Хлѣвное) (♀♀).

565. *A. laciniata* L. Тамъ же, но рѣже.

566. *A. hastata* L. Нечаевскій садъ.

567. *Chenopodium album* L. α) *commune* β) *viride*. Оч. часто, особенно послѣдняя разновидность.

568. *C. urbicum* L. α) *vulgare* Ledeb. По обрывамъ около Паниковца; улицы Задонска (♀♀).

569. *C. hybridum* L. Мусорн. мѣста бл. Бѣлоколодзскаго, (♀♀).

570. *Axyris amaranthoides* L. По полотну желѣзной дороги  
бл. Грязей.

Polygonneae.

571. *Polygonum polymorphum* Ldb.  $\alpha$ ) *alpinum* Ld. (P.  
alpinum All.). Каменистые обрывы Моховатаго верха ( $\frac{1}{\div}$ ).

572. *P. bistorta* L. По сырьимъ лугамъ, часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

573. *P. amphibium* L.  $\alpha$ ) *natans* M. Въ Дону.  $\beta$ ) *terrestre*  
*Lechr.* (f. *hirsuta et glabra*) По берегамъ Дона ( $\frac{\div}{\div}$ ).

574. *P. lapathifolium* L.  $\alpha$ ) *typicum*  $\beta$ ) *incanum*. Часто  
( $\frac{\div}{\div}$ ).  $\gamma$ ) *nodosum* (P. *nodosum* Pers). Сырыя поля бл. Муравлян-  
скаго лѣса ( $\frac{\div}{\div}$ ).

575. *P. mite* Schram. Найдено на Воронежскихъ лугахъ.

576. *P. minus* Huds. Берега стоячихъ водъ близъ Подгорна-  
го ( $\frac{\div}{\div}$ ).

577. *P. Hydropiper* L. Часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

578. *P. convolvulus* L. Оч. часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

579. *P. dumetorum* L. Встрѣчается по садамъ (Калабинскій  
хуторъ; садъ въ Задонскѣ—г. Исаевъ) оч. разсѣянно и рѣдко, въ-  
роятно, только занесенная.

580. *P. aviculare* L.  $\alpha$ ) *erectum*  $\beta$ ) *procumbens*. Оч. час-  
то ( $\frac{\div}{\div}$ ).

581. *Rumex maritimus* L. По берегу рѣкъ (особенно по  
Дону), ручьевъ etc., часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

582. *R. Nemolapathum* Ehr. Часто.

583. *R. crispus* L. Оч. часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

584. *R. domesticus* Hartm. Часто ( $\frac{1}{\div}$ ).

585. *R. aquaticus* L. Часто.

586. *R. confertus* W. Оч. часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).

587. *R. Hydrolapathum* Huds. По берегу Воронежа и боло-  
та бл. Казачьяго ( $\frac{\div}{\div}$ ).

588. *R. Acetosa* L. Оч. часто ( $\frac{1}{\div}$ ).

589. *R. Acetosella* L. Оч. часто ( $\frac{\div}{\div}$ ).  $\beta$ ) *multifida* Koch.  
посѣвъ бл. Нечаевки ( $\frac{1}{\div}$ ).

Santalaceae.

590. *Thesium ramosum* Hayne. По известковымъ высотамъ  
(Нечаевка, Моховатый верхъ, Хлѣвное)  $\frac{1}{\div}$ .

591. *T. ebracteatum* H. Возвышенные места, лесные поляны и т. д., (Нечаевка, Скитский лес, Казачье, Муравлянский лес).

Aristolochieae.

592. *Asarum Europaeum* L. Часто (‡‡).

593. *Aristolochia Clematitis* L. По возвышенным местам, обрывамъ, межамъ и т. д., не рѣдко (берегъ Дона, берегъ Воронежа, Скитский лес) ‡‡.

Euphorbiaceae.

594. *Euphorbia sp?* Форма карликовая съ продолговато-обратно-ovalьными листьями. Найдена въ Нечаевскомъ саду и на известковыхъ обрывахъ Моховатаго верха. Быть можетъ, это разновидность *E. Esula*.

595. *E. virgata* W. et K. Оч. часто (÷ и ‡‡).

596. *E. Esula* L. По открытымъ местамъ (÷).

597. *E. procera* M. B.  $\alpha$ ) *leiocarpa* Led. По леснымъ и открытымъ склонамъ ÷ (Нечаевка). Встрѣчается нерѣдко совершенно гладкая.

598. *Mercurialis perennis* L. По тѣнистымъ лесамъ ÷ и ‡‡.

Urticaceae

599. *Urtica dioica* L. Оч. часто (‡‡).

600. *U. urens* L. Оч. часто (‡‡).

Cannabineae.

601. *Humulus Lupulus* L. По берегамъ ручьевъ и т. д., часто (÷ и ‡‡).

Ulmaceae.

602. *Ulmus effusa* L. По лесамъ.

603. *U. campestris* L.  $\alpha$ ) *typica* (glabra). По лесамъ (÷).  $\beta$ ) *montana* (minor. *U. minor*. Mill.). По возвышенностямъ и склонамъ; въ формѣ кустарника или небольшаго дереваца.

604. *Ulmus suberosa* Ehr. (*U. campestris*  $\beta$ ) *suberosa* Koch.). По возвышеннымъ местамъ и склонамъ, особенно известковымъ. Наши экземпляры представляютъ гораздо меньшее развитіе пробко-

выхъ наростовъ, чѣмъ болѣе южные (напр. изъ Коротояка), и встрѣчаются только въ формѣ кустарника или маленькаго деревца. Это *U. pumila Pall.* (ср. Литвинова, Очеркъ растит. формаций Тамбовск. г.).

Betulineae.

605. *Betula alba L.* Часто ( $\frac{++}{++}$ ).

606. *Alnus glutinosa Gaertn.* По берегамъ Воронежа  $\frac{++}{++}$ ; въ друг. мѣстахъ рѣже ( $\frac{-}{-}$  и  $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).

Cupuliferae.

607. *Quercus pedunculata Ehrh.* Преобладающая и характерная форма лѣсовъ ( $\frac{++}{++}$ ).

608. *Corylus Arellana L.* По лѣсамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).

Salicineae.

609. *Salix fragilis L.* Около рѣкъ и прудовъ  $\frac{-}{-}$  и  $\frac{\cdot}{\cdot}$ .

610. *S. alba L.* Тамъ же ( $\frac{-}{-}$  и  $\frac{\cdot}{\cdot}$ ); по берегамъ Воронежа образуетъ цѣлые рощи старыхъ деревьевъ ( $\frac{++}{++}$ ).

611. *S. pentandra L.* Изрѣдка по сырьимъ лѣсамъ (Муравлянскій лѣсъ).

612. *S. Amygdalina L.* По берег. рѣкъ и ручьевъ, оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).

613. *S. nigricans L.* По лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{++}{++}$ ).

614. *S. purpurea L.* По берегу Дона сплошными полосами ( $\frac{++}{++}$ ).

615. *S. viminalis L.* Тамъ же, вмѣсть съ предыдущею ( $\frac{++}{++}$ ).

616. *S. Capraea L.* По лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).

617. *S. cinerea L.* Сырыя и болотныя мѣста у ручьевъ ( $\frac{\cdot}{\cdot}$  и  $\frac{++}{++}$ ).

618. *S. aurita L.* По сырьимъ мѣстамъ (Муравлянскій лѣсъ, Скитскій л. и др. м.)  $\frac{\cdot}{\cdot}$ .

619. *S. depressa L.* По лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{\cdot}{\cdot}$  и  $\frac{++}{++}$ ).

620. *S. repens L.* (*vulgaris* и *angustifolia Wulf.*). Мшистое болото и на днѣ оврага въ Муравлянскомъ лѣсу ( $\frac{-}{-}$ ) (Въ Липецк. у. на бер. Воронежа  $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).

621. *S. Lapponeum L.* Тамъ же ( $\frac{-}{-}$ ).

622. *S. philicifolia* L. Сырыя мѣста по р. Воронежу, изрѣдка.  
623. *S. daphnoides* Villd. По берегу Дона, изрѣдка.  
624. *Populus tremula* L. Оч. часто ( $\frac{1}{\cdot}$  и  $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).

II) MONOCOTYLEDONEAE.

Typhaceae,

625. *Typha latifolia* L. По берегу р. Воронежа бл. Подгорнаго и Грязнаго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
626. *T. angustifolia* L. Тамъ же ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
627. *Sparganium simplex* Huds. Мѣстами (Казачье, Грязное, Подгорное)  $\frac{1}{\cdot}$ .  
628. *S. ramosum* Huds. Болотистый ручей бл. Дерноваго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ); прудъ бл. Нечаевки.

Lemnaceae.

629. *Lemna minor* L. Единственный повсюду распространенный видъ.  
630. *L. trisulca* L. Въ стоячихъ и текущихъ водахъ по р. Воронежу ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ); бл. Казачьяго etc., но не часто).  
631. *Spirodela polyrhiza* Schleid. Тамъ же.

Najadeae.

632. *Caulinia fragilis* Willd. Прудки и канавы по берегу Воронежа бл. Грязнаго и Подгорнаго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
633. *Najas major* Bth. На днѣ р. Воронежа бл. Грязнаго и Бѣлоколодскаго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).

Potameae.

634. *Potamogeton natans* L. Заливныя воды бл. Казачьяго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
635. *P. lucens* L. По Дону и Воронежу ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
636. *P. perfoliatus* L. По текущимъ и стоячимъ водамъ, часто ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
637. *P. crispus* L. Въ Воронежѣ; кажется, рѣдко.  
638. *P. pectinatus* L.  $\beta$ ) *vulgaris*. Заливныя воды бл. Казачьяго.  $\beta$ ) *scoparius* Walls. Заливныя воды Воронежа бл. Грязнаго ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ ).  
639. *P. pusillus* L. Въ Дону.

luncagineae.

640. *Triglochin palustre* L. Особено по берегу Дона (♀♀).

Butameae

641. *Butomus umbellatus* L. По Дону (♀♀).

Hydrocharideae.

642. *Stratiotes aloides* L. Заливные воды бл. Грязного и Подгорного (♀♀).

643. *Hydrocharis Morsus ranae* L. Там же (♀♀).

Alismaceae.

644. *Alisma plantago* L. Часто (♀♀).

645. *Sagittaria Sagittifolia* L. Часто (♀♀).

Orchideae.

646. *Orchis incarnata* L. Въ сырыхъ лѣсахъ, рѣдко (—) (Муравлянскій лѣсъ); на болотистыхъ лугахъ Воронежа, кажется, встрѣчается чаще.

647. *O. maculata* L. (чаще feliis immaculatis). Тѣнистый лѣсъ бл. Рѣпца, рѣдко.

648. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Мѣстами, по кустарникамъ и лѣсамъ (—, рѣже —).

649. *Platanthera chlorantha* Cust. По тѣнистымъ лѣсамъ и кустарникамъ, дов. разсѣянно (Кустарникъ бл. Нечаевки —; Рѣпецкій, Скитскій, Муравлянскій и Викулинскій лѣса —<sup>1</sup>).

650. *Epipactis latifolia* All. 3) *varians* Rchb. По горнымъ кустарникамъ и лѣсамъ, мѣстами (—). (Нечаевка, Муравлянскій лѣсъ, Ситная).

651. *E. palustris* Cr. Найдены безцвѣтные стебли (21-го июня и 19-го июля) въ мшистомъ болотѣ Муравлянского лѣса (—).

652. *Listera ovata* R. Br. По тѣнистымъ лѣсамъ, довольно рѣдко и разсѣянно (—) (Муравлянскій, Рѣпецкій, Викулинскій лѣса).

<sup>1</sup>) Въ спискѣ г. Гинальского указ. *P. bifolia*.

653. *Neottia Nidus avis L.* По тѣнистымъ лѣсамъ, рѣдко и разсѣянно (Муравлянскій и Викулинскій лѣсъ).

Iridaceae.

654. *Gladiolus imbricatus L.* Холмистый кустарникъ бл. Моховатаго верха, горный кустарн. бл. Казачьяго ( $\div$ ).

655. *Iris pseudacorus L.* Заливныя воды бл. Задонска и Казачьяго; по берегамъ Воронежа бл. Грязнаго и Подгорнаго ( $\div\div$ ).

656. *I. furcata M. a B.* Дернистая возвышенности и склоны, мѣстами ( $\div$ ).

657. *I. arenaria W. et K.* Дернистый возвышенный лугъ Нечаевскаго парка ( $\div$ ).

658. *I. pumila L.* Моховатый верхъ (—).

Colchicaceae.

659. *Veratrum album L. β) Lobelianum Koch.* Часто ( $\div\div$ ).

660. *V. nigrum L.* Вмѣстѣ съ предыдущимъ, но гораздо рѣже (Яблоновъ верхъ бл. Нечаевки  $\div$ ).

Asparagaceae.

661. *Asparagus officinalis L.* По открытымъ возвышеностямъ, часто ( $\div\div$ ).

662. *Paris quadrifolia L.* По тѣнистымъ лѣсамъ, изрѣдка (Муравляное, Скитскій лѣсъ, Ситная).

663. *Majanthemum bifolium DC.* По кустарникамъ и лѣсамъ, часто ( $\div\div$ ).

664. *Convallaria majalis L.* Часто ( $\div\div$ ).

665. *Polygonatum multiflorum Desf.* По гористымъ кустарникамъ и лѣсамъ, часто ( $\div\div$ ).

666. *P. officinale All.* Гораздо рѣже предыдущаго вида.

Liliaceae.

667. *Anthericum ramosum L.* По возвышеннымъ мѣстамъ, открытымъ и кустарниковымъ склонамъ, не рѣдко ( $\div$ ).

668. *Gagea lutea Sch.* По садамъ и тѣнистымъ лѣсамъ и кустарникамъ ( $\div\div$ ).

669. *G. minima* Schultz. По открытымъ мѣстамъ ( $\frac{++}{++}$ ).  
670. *G. pusilla* Sch. Паровые поля и обрывы бл. Нечаевки ( $\frac{+}{+}$ ).  
671. *Fritillaria Ruthenica* W. Горный тѣнистый Муравлян-  
ский лѣсъ ( $\frac{++}{++}$ ); горный кустарникъ бл. Казачьяго (г. Исаевъ).  
672. *Muscari pallens* Fisch. Дерновая возвышенность Яблон-  
ова верха бл. Нечаевки ( $\frac{+}{+}$ ). Цвѣт. съ конца апрѣля.  
673. *Lilium Martagon* L. По горнымъ кустарникамъ и лѣ-  
самъ, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).  
674. *Scilla cernua* L.  $\alpha)$  *typica* (изрѣдка съ бѣлыми цвѣта-  
ми)  $\beta)$  *pluriflora* Led. По кустарникамъ, лѣсамъ и садамъ  $\frac{++}{++}$ .  
(Нечаевка, Сергиевка).  
675. *Allium angulosum* L. Сырые заливные луга по Воронежу  
(Грязное, Подгорное)  $\frac{+}{+}$ .  
676. *A. rotundum* L. По лугамъ, межамъ, паровымъ полямъ,  
оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
677. *A. oleraceum* L. По кустарникамъ и лѣсамъ ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
678. *A. paniculatum* L.  $\alpha)$  *legitimum* Led.  $\beta)$  *maxilentum*  
Led. По известковымъ обрывамъ Моховатаго верха и Быка ( $\frac{++}{++}$ ).  
679. *A. albidum* Fisch. Известковые обрывы Моховатаго вер-  
ха и Быка; старинный курганъ бл. Нечаевки ( $\frac{++}{++}$ ).

Iuncaceae.

680. *Luzula campestris* DC.  $\alpha)$  *typica*  $\beta)$  *multiflora* Lejeun. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{+}{+}$ ).  
681. *Iuncus communis* E. M.  $\alpha)$  *effusus* По ручьямъ, оврагамъ etc. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
682. *I. lamprocarpus* Ehrh.  $\alpha)$  *typicus*  $\beta)$  *acuminatus*  
Kaufm.  $\gamma)$  *pallidescens* E. M. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ )  $\delta)$  *fluitans* Ehr. Высохшій или заливныхъ водъ бл. Кошарь ( $\frac{++}{++}$ ).  
683. *I. atratus* Krock. Мѣстами.  
684. *I. compressus* Jacq. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
685. *I. bufonius* L. Оч. часто ( $\frac{++}{++}$ ).

Cyperaceae.

686. *Heleocharis palustris* R. Br. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
687. *H. acicularis* R. Br. По р. Воронежу ( $\frac{++}{++}$ ).

688. *Scirpus lacustris* L. По Дону и Воронежу, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
689. *S. maritimus* L. По Дону и Воронежу, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$ ).  
690. *S. sylvaticus* L. Часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
691. *Cyperus fuscus* L. а) *virescens* Koch. Высохшій изъ заливныхъ стоячихъ водь бл. Кошарь ( $\frac{+}{+}$ ).  
692. *Eriophorum latifolium* L. Мшистое болото Муравлянскаго лѣса ( $\frac{++}{++}$ ).  
693. *Carex vulpina* L. а) *typica* β) *nemorosa* Rebent. Болотистыя мѣста Муравлянскаго лѣса ( $\frac{++}{++}$ ).  
694. *C. muricata* L. α) *typica* β) *virescens* Lomnitz. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
695. *C. teretiuscula* Good. Мшистое болото Муравлянскаго лѣса ( $\frac{++}{++}$ ).  
696. *C. leporina* L. По сырымъ мѣстамъ, часто. α) *typica* ( $\frac{++}{++}$ ) β) *argyroglochin* Koch. По лѣсамъ, рѣже.  
697. *C. elongata* L. По сырымъ лугамъ, не рѣдко ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ ).  
698. *C. remota* L. Сырой горный лѣсъ бл. Бѣлоколодзскаго ( $\frac{++}{++}$ ). 20-го июля съ плодами.  
699. *C. Schreberi* Schr. По сухимъ мѣстамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
700. *C. digitata* L. По тѣнистымъ лѣсамъ, мѣстами ( $\frac{+}{+}$ ).  
701. *C. pediformis* C. A. M. Муравлянскій лѣсъ ( $\frac{+}{+}$ ).  
702. *C. Michelii* Host. По гористымъ лѣсамъ и кустарникамъ ( $\frac{++}{++}$ ).  
703. *C. pilosa* L. По тѣнистымъ лѣсамъ, мѣстами.  
704. *C. montana* W. По сухимъ открытымъ возвышенностямъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
705. *C. praecox* Jacq. Тамъ же, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
706. *C. ericetorum* Poll. Тамъ же ( $\frac{++}{++}$ ).  
707. *C. pallescens* L. По сырымъ лѣсамъ и кустарникамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).  
708. *C. humilis* Lyss. Известковые обрывы Быка ( $\frac{+}{+}$ ); 1-го мая въ цвету. Наше растеніе очень низкорослое (2''); нижний женскій колосокъ иногда на значительно удлиненной ножкѣ; иногда цветочный стебель заключаетъ одни женскіе колосья; прицвѣтники буровато-красноватые съ широкою перепончатою каймою и зелено-ватою серединою—вообще растеніе не такъ блѣдно, какъ у Рейхенбаха (Т. IX, CCXXX, 595).

709. *C. vulgaris* Fr. Часто (++) β) *Dreyeri* Kaufm. Болота Муравлянского леса.

710. *C. acuta* L. По стоячимъ водамъ бл. Грязного и друг. мѣст. по Воронежу. Наши экземпляры вполнѣ соответствуютъ Козловскимъ («fr. evid. nervosis, vaginis integris». Кожевниковъ, Flora v. Koslow, 75).

711. *C. vesicaria* L. По топкимъ мѣстамъ, не часто (Сергievка, Грязное, Муравлянский лесъ)  $\frac{1}{2}$ .

712. *C. ampullacea* Good. Мицестое болото Муравлянского леса ( $\frac{1}{2}$ ).

713. *C. hirta* L. α) *genuina* β) *hirtaeformis* Pers. По сырьимъ мѣстамъ, часто (++) .

714. *C. orthostachys* C. а M. Стоячая вода по дорогѣ изъ Нечаевки въ Дерновое ( $\frac{1}{2}$ ); 27-го июля съ плодами).

#### Gramineae.

715. *Echinochloa Crus galli* P. B. α) *inermis*; очень часто— β) *aristata* Rchb. По песчанымъ, заливнымъ мѣстамъ, оч. часто (++) .

716. *Setaria viridis* P. de B. Часто ( $\frac{1}{2}$ ).

717. *S. glauca* P. d. B. Часто.

718. *Digitaria filiformis* Koehl. Песчаные засѣвы *Panicum milliaueum* бл. Нечаевки (++) .

719. *Phalaris arundinacea* L. Болота бл. Казачьяго (++) .

720. *Hierochloa odorata* Whlby. Сырыя мѣста по ручьямъ и лѣсамъ, мѣстами (Нечаевка, Муравляное, Скитский лесъ),  $\frac{1}{2}$ .

721. *Anthoxanthum odoratum* L. Оч. часто (++) .

722. *Alopecurus pratensis* L. Оч. часто (++) .

723. *A. geniculatus* L. Так же.

724. *A. fulvus* Sm. Сырыя мѣста бл. Казачьяго и др. (++) .

725. *Phleum pratense* L. Оч. часто ( $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}$ ).

726. *P. Boehmeri* Wb. По открытымъ возвышеннымъ мѣстамъ, часто (++) . Встрѣчаются, въ тѣнистыхъ мѣстахъ, экземпляры съ очень удлиненными развѣтвленіями колосовидной метелки и болѣе высокаго роста (*v. verticillatum* m.).

727. *Beckmannia eruciformis* Host. По сырьимъ лугамъ, часто (++) .

728. *Agrostis Stolonifera L.*  $\alpha)$  *vulgaris* With  $\beta)$  *alba* Schr. (съ  $\gamma)$  *prorepens* Koch.). Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
729. *A. canina* L. По сырьимъ лугамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
730. *Apera Spica venti* P. d. B. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
731. *Leersia oryzoides* S. Разсѣянно (сыре песчаное мѣсто бл. устья Черняевки, иль бл. озерка около Кошарь; въ Липецк. у. противъ Бѣлоколодасского).
732. *Calamagrostis Epigeios* Roth. По сухимъ кустарникамъ и обрывамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
733. *C. sylvatica* DC. По кустарникамъ и лѣсамъ ( $\frac{+}{+}$ ).
734. *C. lanceolata* Rth. Заливныя, болотистыя мѣста бл. Казачьяго ( $\frac{++}{++}$ ).
735. *Millium effusum* L. По лѣсамъ ( $\frac{+}{+}$ ).
736. *Stipa pennata* L. Открытыя возвышенныя мѣста; теперь рѣдко. (Нечаевка и др.)  $\frac{++}{++}$ .
737. *S. capillata* L. Известковые обрывы Моковатаго верха и Быка ( $\frac{+}{+}$ ).
738. *Phragmites communis* Trin. По Дону и Воронежу ( $\frac{++}{++}$ ).
739. *Koeleria cristata* Pers. По сухимъ возвышеностямъ, часто ( $\frac{+}{+}$  и  $\frac{++}{++}$ )  $\alpha)$  *typica*  $\beta)$  *gracilis* Koch. Колоски всегда окрашены въ фиолетовый цветъ.
740. *Aira caespitosa* L. По сырьимъ и тѣнистымъ мѣстамъ ( $\frac{++}{++}$ ).
741. *Avena pubescens* L. По лѣсамъ и кустарникамъ, обыкновенно возвышенными, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
742. *A. flavesces* L. По такимъ же мѣстамъ, но рѣже (Нечаевка, Сергіевска, Скитскій лѣсъ),  $\frac{+}{+}$ .
743. *A. pratensis* L. По такимъ же мѣстамъ (Скитскій лѣсъ, Муравлиное),  $\frac{+}{+}$ .
744. *Melica nutans* L. По лѣсамъ, часто ( $\frac{++}{++}$ ).
745. *M. ciliata* L. Известковые обрывы Быка ( $\frac{++}{++}$ ).
746. *M. altissima* L. Каменистый лѣсной склонъ бл. Паниковца ( $\frac{+}{+}$ ).
747. *Briza media* L. Часто ( $\frac{+}{+}$ ).
748. *Poa annua* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
749. *P. pratensis* L. Часто ( $\frac{++}{++}$ ).
750. *P. bulbosa* L.  $\alpha)$  *genuina* Известковые обрывы Быка Хлѣвиаго и Конизова ( $\frac{++}{++}$ ).

751. *P. compressa* L.  $\div$ .
752. *P. nemoralis* L. По лѣсамъ и садамъ, часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).  $\beta)$  *rigidula* Koch.? По открытымъ мѣстамъ. Колоски почти прямо стоящіе и окрашенные въ фиолетовый цвѣтъ.
753. *P. fertilis* Host. По сырьимъ мѣстамъ около ручьевъ, въ лѣсахъ и т. д. (Нечаевка, Скитской лѣсь, Казачье).
754. *Poa trivialis* L. По сырьимъ, тѣнист. мѣстамъ, изрѣдка.
755. *Eragrostis pilosa* P. de B. Песокъ на днѣ оврага близъ Хлѣвнаго ( $\div$ ).
756. *Catabrosa aquatica* P. d. B. Сырыя мѣста по берегамъ рѣкъ и ручьевъ ( $\div$  и  $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
757. *Glyceria fluitans* R. Br. По ручьямъ и канавамъ, часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
758. *G. spectabilis* M. et K. Пруды и канавы бл. Грязного и Казачьяго ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
759. *Molinia coerulea* Moench. Гдѣ найдена, не помню: кажется, на берег. Воронежа.
760. *Dactylis glomerata* L. Часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
761. *Festuca ovina* L. Часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).  $\alpha)$  *vulgaris*  $\beta)$  *duriuscula* K.  $\gamma)$  *glauca* Schrad. Каменистые обрывы Быка.
762. *F. elatior* L. Оч. часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
763. *F. rubra* L. Оч. часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
764. *F. gigantea* Vill. По тѣнистымъ и сырьимъ лѣсамъ, изрѣдка (Нечаевка, Скитской лѣсь и др. м.),  $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ .
765. *Brachypodium pinnatum* P. d. B.  $\alpha)$  *caespitosum* Koch. По лѣснымъ и открытымъ возвышенностямъ (Нечаевка, Скитской лѣсь),  $\div$ .
766. *B. sylvaticum* L. Тѣнистый и сырой лѣсь бл. Бѣлоколоводскаго ( $\div$ ).
767. *Bromus tectorum* L. По каменистымъ высотамъ и обрывамъ (Быкъ, Хлѣвное),  $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ .
768. *B. mollis* L. По полямъ и лугамъ, нерѣдко ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
769. *B. secalinus* L.  $\alpha)$  *typicus*  $\beta)$  *aristatus*. Часто ( $\div$  и  $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
770. *B. arvensis* L. По полямъ, часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).
771. *B. inermis* Seyss.  $\alpha)$  *typicus*  $\beta)$  *aristatus*. Часто ( $\ddot{\cdot}\ddot{\cdot}$ ).

772. *B. patulus* M. et K. α) *typicus* β) *velutinus* Koch.? По каменистымъ высотамъ и обрывамъ (берегъ Дона бл. Кошарь и Патриаршаго, Быкъ)  $\frac{++}{\cdot}$ .
773. *B. squarrosum* L. Известковая высоты бл. Хлѣвнаго ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
774. *B. erectus* Huds. Изв. высоты бл. Хлѣвнаго, изрѣдка ( $\frac{\cdot}{+}$ ).
775. *B. asper* Murr. Тѣнистый горный Муравлянскій лѣсъ; рѣдко ( $\frac{\cdot}{+}$ ).
776. *Triticum repens* L. α) *typicum*. β) *Leersianum* Rchb. Часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
777. *T. caninum* Schreb. По кустарникамъ и лѣсамъ, мѣстами ( $\frac{\cdot}{+}$ ).
778. *T. cristatum* Sch. По каменистымъ возвышенностямъ и обрывамъ ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
779. *T. rigidum* Schrad. α) *typicum* β) *villosum* m. Ко-  
лоски и листья съ длинными щетинистыми волосками. Каменистые  
обрывы Быка и Моховатаго верха, известков. высоты бл. Хлѣв-  
наго etc. ( $\frac{++}{\cdot}$ ).

---

### III. CRYPTOGAMAE.

#### Equisetaceae.

780. *Equisetum arvense* L. Оч. часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
781. *E. sylvaticum* L. Часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
782. *E. palustre* L. По сырьимъ лугамъ и болотамъ, часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
783. *E. limosum* L. (*typicum* и *fluviatile* L.) Тамъ же ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
784. *E. hyemale* L. Сыре мѣсто на горномъ обрывѣ Мохово-  
ватаго верха ( $\frac{\cdot}{+}$ ).

#### Filices.

785. *Pteris aquilina* L. По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ,  
очень часто ( $\frac{++}{\cdot}$ ).
786. *Polystichum Felix mas* L. По лѣсамъ и кустарникамъ,  
мѣстами (Викулинскій лѣсъ, Муравляное, Казачье),  $\frac{\cdot}{+}$ .
787. *P. Spinulosum* DC. Рѣдко. (Плодоносная вайи найде-  
ны въ тѣнистомъ горномъ лѣсу бл. Бѣлоколодскаго, бесплодныя—  
въ сырьемъ оврагѣ Викулинскаго лѣса)  $\frac{-}{+}$ .

788. *P. Thelypteris Rth.* Горный лѣсъ бл. Бѣлоколодзска го ( $\frac{+}{+}$ ).
789. *Polypodium Dryopteris L.* Рѣдко (тѣнистый оврагъ Викулинского лѣса),  $\frac{+}{+}$ .
790. *P. cristatum Roth.* Рѣдко (Муравлянскій лѣсъ).
791. *Cystopteris fragilis Bernh.* Въ Викулинскомъ лѣсу ( $\frac{+}{+}$ ).
792. *Asplenium filix femina L.* Сырой лѣсъ на берегу Воронежа бл. Бѣлоколодзскаго ( $\frac{+}{+}$ ).

---

III.

Въ добавленіе къ списку позволю себѣ нѣсколько самыхъ короткихъ пояснительныхъ и дополнительныхъ замѣчаній.

1. Задонскій уѣздъ составляетъ самую сѣверную часть Воронежской губерніи <sup>1)</sup> и лежитъ на Восточной окраинѣ центральной русской возвышенности (см. гипсометрическую карту Р. Тилло); восточную границу въ данномъ мѣстѣ составляетъ теченіе р. Воронежа, за которымъ тянется обширная песчаная и низменная равнина, покрытая, между прочимъ, сосновымъ лѣсомъ. Такимъ образомъ, Задонскій уѣздъ расположены на возвышенномъ доломитѣ Девонской формациіи, прикрытому, кромѣ другихъ отложеній, довольно глубокимъ слоемъ чернозема. Западную границу уѣзда составляетъ Донъ, который проектируется здѣсь своимъ необыкновенно быстрымъ течениемъ, мелкое и устьяное камнями, русло, большею частию среди известковыхъ высотъ; такія же обнаженія встрѣчаются по берегамъ верховъ и рѣчекъ, большею частью уже пересохшихъ, впадающихъ въ Донъ (напр. Быкъ, Моховатый верхъ), т. е. въ Западной части уѣзда. Водная flora Дона, въ виду его быстрого теченія, необычайно бѣдна, а берега, необыкновенно каменистые, рѣдко представляютъ поэмные луга. Изъ характерныхъ растеній, сопровождающихъ теченіе рѣки, можно отметить почти правильную полосу *Salix rigpurea*, *Artemisia Dracunculus* и *procera*, вдоль самого берега, и настоящую ленту (на нѣкоторомъ разстояніи отъ Дона,

<sup>1)</sup> Задонскъ лежитъ по  $52^{\circ}23'$  ш. и  $56^{\circ}35'$  д. Пространство уѣзда показывается отъ 2045 до 2209 кв. верстъ; наибольшая длина 88 верстъ, ширина 54 в. (Памятникъ Вор. г. за 1862 г., II. кн. 1878—79 г., Геогр. Слов. Семенова).

какъ бы на границѣ разлива) изъ *Astragalus onobrychis* и *virgatus*, *Salvia sylvestris* и *Ononis hircina*. Теченіе и долина Воронежа представляютъ совершенную противоположность: теченіе необычайно тихое, даже въ половодье, обширные поемные луга, нерѣдко устьянные озерками, протоками, лужами etc., отсутствіе ясно замѣтныхъ известняковыхъ обнаженій. Отсюда проистекаютъ: замѣтальное богатство водной флоры (между прочимъ, громадныя массы *Najas* и *Caulinia*) и разнообразіе растеній, ищущихъ сырость и заливныя мѣста (напр. изъ послѣднихъ: *Erythraea ramosissima*, *Trifolium fragiferum*, *Nasturtium brachycarpum*, *Scutellaria hastifolia*, *Thalictrum flavum*, *Ranunculus divaricatum terrestre*, *Allium angulosum* и мног. др.). Высоты, окаймляющія Воронежъ, покрыты почти сплошь тѣнистымъ лѣсомъ, который иногда, въ видѣ почти непроходимой чащи кустарниковъ и полудеревьевъ, спускается къ самому берегу рѣки. Лѣсъ этотъ заключаетъ въ себѣ много растительныхъ формъ, не встречающихся въ Донскомъ бассейнѣ<sup>1)</sup>), какъ напр. *Scutellaria altissima*, *Aconitum pallidum*, *Teucrium Scordium*, *Cuscuta lupuliformis*, *Arabis pendula et hirsuta*, *Eupatorium cannabinum*, *Circaeа lutetiana*, *Leonurus marrubiastrum*, *Geranium sibiricum* и др.

2. Растенія, сопровождающія известняки, суть главнымъ образомъ слѣдующія: <sup>2)</sup> *Ceratocephalus orthoceras*, *Fumaria Vailantii*, *Syrenia angustifolia*, *Alyssum montanum*, *A. minimum*, *Psilonema calycinum*, *Camelina microcarpa*, *Isatis tinctoria* (кажется, преимущественно на пескѣ, прикрывающемъ известковые камни), *Polygala sibirica*, *Gypsophila altissima*, *Dianthus campestris*, *Silene Otites*, *S. effusa*, *S. chlorantha*, *Arenaria graminifolia v. pubescens*, *Linum flavum*, *L. perenne*, *Oxythropis pilosa*, *Astragalus virgatus*, *A. austriacus*, *Spiraea crenifolia*, *Cotoneaster vulgaris*, *Trinia Henninghi*, *Daucus Carota* (какъ и *Isatis*), *Asperula galioides*, *A. cynanchica*, *Echinops Ritro*, *Centaurea Marschalliana*, *Carduus hamulosus*, *Jurinea mollis*, *Tragopogon major*, *Scorzonera hispanica*, *S. taurica*, *Chondrilla juncea*, *Crepis rigida*, *Linaria genistifolia*, *Thymus odoratissimus*, *Salvia nutans*, *Thesium ramosum*, *Allium paniculatum*, *A. albidum*, *Carex pumilis*, *Poa bulbosa typica*, *Stipa capillata*, *Bromus tectorum*, *B. patulus*, *B. squarrosum*, *Triticum cristatum*, *T. rigidum*, *Melica ciliata*, *M. altissima*. Изъ всѣхъ

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя изъ этихъ формъ я, впрочемъ, находилъ на Елецкомъ берегу Дона.

<sup>2)</sup> Курсивомъ отмѣчены тѣ растенія, которыхъ мѣхъ попадались исключительно на известнякѣ.

этихъ растеній, какъ кажется, только *Gypsophila altissima*, *Polygala sibirica*, *Asperula cynanchica*, *Carex humilis*, *Cotoneaster vulgaris* и *Crepis rigida* могутъ считаться характерными спутниками известника; остальные, въ мѣстностяхъ болѣе южныхъ и юго-западныхъ, встречаются безразлично почти на всякой почвѣ (ср. напр. съ указаціями у Роговича, Обозрѣніе раст. флоры Киевскаго округа, К. 1879). Къ этому можно еще прибавить, что въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ многія растенія, встречающіяся въ Задонскомъ уѣздѣ безразлично, попадаются только на известнякѣ<sup>1)</sup>). Такимъ образомъ, большую часть формъ, сопровождающихъ наши известники, повидимому можно признать только *мѣстно* (а слѣдовательно, и *случайно*) характерными. На известнякахъ Задонскаго у. мнѣ не удалось встрѣтить многіе виды, встречающіяся въ изобилии, *совершенно рядомъ* (за р. Дономъ), въ Елецкомъ у. на Галичьеи горѣ, мѣстности чрезвычайно интересной въ ботаническомъ отношеніи и довольно тщательно изслѣдованной<sup>2)</sup>; позволяю себѣ думать, что отсутствіе это, въ данномъ случаѣ объясняется не однѣмъ только, всегда возможнымъ, случайнymъ просмотромъ собирателя, но главнымъ образомъ топографическими и географическими особенностями Галичьеи горы (абсолютная высота и недоступность), которая сохраняетъ до сихъ поръ то, что, вслѣдствіе разнообразнѣйшихъ условій, исчезло въ другихъ мѣстахъ, болѣе доступныхъ и геологическимъ переворотамъ и истребляющей рукѣ человѣка.

3. Песчаныя пространства встречаются довольно рѣдко, преимущественно по высохшимъ русламъ рѣчекъ и верховья. Исключительно песокъ выбираютъ: *Oenothera biennis*, *Onopordon Acanthium*, *Herniaria odorata*, *Artemisia austriaca* и *campestris*, *Xanthium spinosum* (о немъ ниже), *Salsola Kali* (найденная, впрочемъ, въ одномъ только мѣстѣ). *Petasites spurius* и *Saponaria vulgaris*, какъ и всегда, слѣдуютъ по песчанымъ берегамъ рѣкъ; *Potentilla supina* и *norvegica* найдены только на пескѣ, въ предѣлахъ разлива Дона; *Galeopsis Tetrahit*, *Raphanus raphanistrum* и *Erodium cicutarium* встречаются, вообще, рѣдко и

<sup>1)</sup> Ср. напр. въ Очеркѣ флоры Тульской г. Кожевникова и Цингера (стр. 25—26) *Clematis recta*, *Adonis vernalis*, *Campanula sibirica*, *Bupleurum falcatum* и др.

<sup>2)</sup> См. Цингера Сборникъ свѣдѣній о флорѣ средней Россіи М. 1886, стр. 517—194, и Ростовцева Verzeichn. d. auf. d. Galitschja Gora wildw. Pflanz. въ Bot-Centralbl. 1889. Кстати, исправлю опечатку въ послѣдней статьѣ: сторожи на Галичьеи горѣ упоминаются не въ XIV-мъ, а въ XVI-мъ ст. (См. Воронежскіе исторические акты).

только на болѣе или менѣе песчаной почвѣ; о *Daucus Carota* и *Isatis tinctoria* упомянуто выше.

4. Хвойныхъ дикорастущихъ растеній въ настоящее время не встрѣчается въ Задонскомъ у. <sup>1)</sup>), но существуютъ убѣдительныя доказательства въ пользу того, что сосновый лѣсъ встрѣчался въ быылая времена, хотя, вѣроятно, и не въ большомъ количествѣ: это, именно, до сихъ поръ сохранившіяся мѣстныя названія уро-чищъ и селеній. Проанализировав карту или списокъ селеній уѣзда, мы, какъ и вездѣ на Руси, встрѣтимъ множество названій, указываю-щихъ на существование лѣса или деревьевъ, въ большинствѣ уже давно исчезнувшихъ. Въ Задонскомъ у. чаще всего мы встрѣчаемъ такія названія: *Дубовое* (самое распространѣнное), *Кленовое*, *Яблоново*, *Липяги* (Липажекъ, Липовка, Липецъ), *Лозы* (Лозовка), *T(Дерновое* (отъ *Prunus Spinosa*), *Ольшанецъ* (Ольховка) етс. Но между этими названіями встрѣчается также три раза и указание на *боръ*. т. е. сосновый лѣсъ, именно: *Кривоборье*, *Борки* (на С. отъ Задонска), *Княжы Борки* (на СВ. отъ города). Хотя теперь мы не найдемъ здѣсь и признаковъ существованія сосны, по уцѣлѣвшія прозвища остаются, какъ и во многихъ другихъ слу-чаихъ, неизгладимыми свидѣтелями того, что въ быылая, отдален-ная времена она здѣсь дѣйствительно росла <sup>2)</sup>). Изъ названныхъ мѣстностей особый интересъ представляетъ Кривоборье (на Ю. отъ города). п. ч. оно упоминается еще XIV-мъ ст. подъ непосредствен-нымъ, еще неизмѣнившимся, именемъ: *Кривой Боръ*, которое какъ бы указываетъ, что въ то время (также и въ XVII-мъ в.) боръ дѣйствительно еще существовалъ <sup>3)</sup>.

5. Въ связи съ существованіемъ бора находится, вѣроятно, и спорадическое находеніе въ Задонскомъ уѣзде нѣкоторыхъ ра-стеній, которыя я позволю себѣ назвать *архаическими*. Мнѣ по крайней мѣрѣ пришлось наткнуться на два такихъ, уцѣлѣвшихъ,

<sup>1)</sup> По ту сторону Воронежа въ Липецкомъ у. боръ тянется на громадное про-странство и характеризуется множествомъ растеній (напр. *Vaccinaceae* и *Calluna*), которыхъ и признаю нѣть въ Задонскомъ у. Въ Елецкомъ у. мнѣ известенъ только одинъ небольшой (въ 40 десятинъ) сосновый сухой лѣсъ бз. села Паниковецъ; ра-стительностью онъ очень бѣденъ: кроме *Rub. tormentilla*, *Pyrola secunda* и *Melampyrum laciniatum*, ничего характерного не найдено.

<sup>2)</sup> Для примѣра укажемъ на *Спасъ на Бору* и *Ивановскій* монастырь подъ Боромъ въ центрѣ Москвы. Сравн. также интересную замѣтку Семенова (Придо-ская флора, стр. 34) объ Елифанскомъ „борѣ“, причемъ мѣстные жители, также какъ и Задонские, совершенно забыли о существованіи у нихъ сосны.

<sup>3)</sup> Повѣствование Игнатія о путешествіи въ Царьградъ въ 1389 году (Никонов-ская лѣтопись подъ указан. годомъ). Въ 1627 году сторожи стоять „подъ Кривымъ Боромъ“ (Воронеж. Акты II, 165).

кажется, отъ прежняго времени, уголка. Одинъ изъ нихъ попался мнѣ, случайно, въ глубокой, но узкой, овражистой лощинѣ Бикулинскаго лѣса (бл. Скита и дороги изъ Кошаръ въ городъ<sup>1)</sup>), гдѣ среди липового кустарника, я нашелъ, нигдѣ не попадавшееся до сихъ поръ, безцвѣтные экземпляры *Pyrola rotundifolia*, цвѣтущую *Pyrola secunda* и также *Polypodium Dryopteris*; такъ какъ особенно *P. secunda* считается спутникомъ «бора», то я и не сомнѣваюсь, что мнѣ встрѣтилось здѣсь укромное мѣстечко, въ которомъ утаились послѣдніе, вымирающіе, остатки флоры бывшаго хвойнаго лѣса. Другой «археологическій» уголокъ попался мнѣ въ Муравлянскомъ лѣсу, именно крошечное (въ нѣсколько  $\square$  сажень) топкое моховое болотце; на немъ не нашлось *Sphagnum*'а, но за то вся флора его невольно переносила на сѣверъ и рѣзко отличалась отъ всего окружающаго: все оно было окружено *Potentilla tormentilla*, кочки资料 самаго болота были покрыты цвѣтущею *Pyrola rotundifolia*, *Eriophorum*, *Parnassia*, *Carex paniculata* и безцвѣтными стеблями *Epipactis palustris*, а въ недальнемъ отъ него разстояніи *Salix lapponum* и *repens*—все растенія очень обыкновенные въ болѣе сѣверныхъ мѣстахъ, но въ изслѣдуемой мною мѣстности нигдѣ мнѣ до сихъ поръ не встрѣчавшіяся.

6. Такимъ образомъ, къ числу исчезающихъ въ уѣздѣ растений принадлежать лѣсныя, но къ нимъ же надо присоединить и степныя, флору «дикого поля», какъ говорили встарину. Причина исчезновенія и тѣхъ и другихъ одинаковая: увеличеніе населенія, повальная вырубка лѣсовъ (особенно съ 60-хъ годовъ), съ выкорчевываньемъ пеньковъ, и распашка степи. Многія степныя растенія, внесенные мною въ списокъ, вѣроятно въ скоромъ времени совершенно исчезнутъ. На первомъ мѣстѣ стоить, кажется, *Stipa pennata*, которая въ 1870 году попадалась мнѣ часто, но уже въ 1882 году составляла рѣдкость<sup>2)</sup>.

7. Къ растеніямъ, наоборотъ надвигающимся, распространяющимся, надо прежде всего отнести, конечно, спутниковъ нашихъ культурныхъ полей. Такъ какъ культура Задонскаго у. относится къ довольно позднему времени (не ранѣе, собственно говоря, конца XVI-го и XVII-го ст.), то этимъ, вѣроятно, объясняется отсутствие или рѣдкость нѣкоторыхъ столь обыкновенныхъ спутниковъ нашихъ обрабатываемыхъ полей, какъ напр. *Lolium*, *Camelina sa-*

<sup>1)</sup> Кажется, лѣсъ этотъ теперь вырубленъ.

<sup>2)</sup> Тоже замѣчаніе дѣлаетъ Котляриновъ въ *Florula der Umgegend v. Koslow.* Bull. 1876.

*tiva, Galeopsis versicolor, Tetrahit, Raphanus raphanistrum*  
etc.

8. Въ заключеніѣ, позволю себѣ сказать два слова объ одномъ оригинальномъ растеніи, съ проблематическою пока родиною <sup>1)</sup>), которое надвигается на насъ съ Юга, именно о *Xanthium spinosum*. Не имѣя возможности говорить о немъ подробно, замѣчу только, что во времена Семенова (Придонск. фл. 109), т. е. въ 1851-мъ году, съверною границею *Xanthium spinosum* считали по Дону 50-й градусъ, теперь же онъ перешелъ 52-й и найденъ мною въ довольно значительномъ количествѣ въ южной части Задонского уѣзда <sup>2)</sup>.

---

*PS.* Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ принести глубокую благодарность извѣстному знатоку нашей центральной флоры, В. Я. Цингеру, къ которому я обращался за совѣтомъ въ сомнительныхъ для меня опредѣленіяхъ, и И. Н. Горожанкину, любезно доставившему миѣ возможность пользоваться гербаріями и книгами Ботаническаго Сада.

### П. Мельгуновъ.

---

<sup>1)</sup> De-Candolle (Prodr. V, 523) указываетъ на Южную Европу, а Asa Grey (Manual of the Botany of the N. United St. 252) на тропическую Америку.

<sup>2)</sup> Къ извѣстнымъ миѣ литературнымъ указаніямъ о географическомъ распространѣніи, позволю себѣ прибавить слѣдующія личныя наблюденія: въ 1882 г. я находилъ его въ большомъ количествѣ въ Закавказье (Тифлісъ, Гори, Поти), по берегу Малой Азіи (Батумъ, Трапезунтъ) и въ окрестностяхъ Константиноополя. Хотя Boissier (Fl. Orient. III, 252) и указываетъ его въ Греціи, но въ окрестностяхъ Афинъ миѣ онъ не попадался.




КАРТА  
ЗАДОНСКАГО УЛЬЗДА

## Границы губерний.

### *Границы уезда.*

Нанесенные на карту селения, большие или меньшие, изображены в ботаническомъ отношении.









卷

44  
Hill